

野菜生育情報(10月6日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下 ()	5/中 ()	6/中 ()	6/下 ()	早	並		生育順調
		氷見市		100	吉晴	100	4/下 ()	5/下 ()	6/上 ()	7/中 ()	並	並		生育順調
	坊主不知	氷見市		100	清心	100	5月仮植		9/上 ()	9/中 ()	並	並		生育順調
	秋まき 初夏どり	氷見市		100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/14 ()	()	()	()	並	並		生育順調
	夏秋、秋冬	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/8	並	並	台風18号による葉折れ	「夏扇4号」で襟の緩み
		富山市 八ヶ山	3 (見込み)	91	夏扇4号	60	1/下	4/上	4/20		並み	並み		順調に生育しているものの、一部で、台風18号による倒伏、茎葉折損が発生
		中央	6.2 (見込み)	100	ホワイトスター 夏扇4号 夏扇パワー	20 70 20	1/24	4/16	3/27	5月下旬	並み	やや不良	萎凋病の多発	大規模生産者のほ場で、萎凋病が多発
		富山市 (大沢野)	3.6	88	夏扇4号 長宝	60 30	2/上	4/上	4/15	5/中	並	やや不良	台風18号による葉折れ	台風18号による葉折れにより、やや収穫が遅れる見込み
		富山市 (大山)	2.5	80	長宝 夏扇4号	50 50	1/下	4/上	3/28	5/中	並	並		収穫中で、概ね順調
		立山町	12.0 (見込み)	92	夏扇パワー 夏扇4号	25 70	1/6	4/下	3/23	6/上	並み	並み		最終土寄せを実施中。
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上 ()	3/下 ()	3/27 ()	4/上 ()	並	並		生育順調
		氷見市		100	夏扇パワー 源翠	50 30	2/上 ()	3/中 ()	3/下 ()	4/中 ()	並	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	4/上 ()	()	4/1 ()	6/上 ()	並	並	台風による強風	生育順調 葉折れや倒伏が見られる
		氷見市		100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下 ()	4/中 ()	()	()	並	並	台風による強風	生育順調 葉折れや倒伏が見られる
	夏秋 秋冬	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7 ()	()	3/30 ()	()	平年並み	並	多雨日照不足	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。
南砺市 (城端)		1.1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上 ()	3/中 ()	3/31 ()	()	平年並み	並	多雨日照不足	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。	
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ハンター ミラージュ	50					並	並		概ね順調
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100	ミラージュ トラッド7	30 30	8下		-	-	晩	並み	曇天、寡日照	曇天、寡日照の影響により、生育は遅れているものの概ね順調に生育
		高岡市	8.0	100	スパイダー	80	()	()	()	()	並	やや不良	台風による強風	露地栽培で葉の傷みが見られる。
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	浜ちゃんのりちゃん	40	周年				並	並		生育は順調。
		富山市 (JAなのはな)	5	100	春の選抜、なつき	70、20	周年				並	並		概ね順調に生育している。
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なかまちなつき	40 30	周年				並	並		生育は概ね良好
		射水市	のべ 11.0ha	100	冬里 なかまちなつき	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
きゅうり	抑制	朝日・入善	0.6	100	スバリ163 フレスコ100	50 30	7/5		7/22		並	並		生育良好
		富山市 (八ヶ山)	0.8 (見込み)		T-178 兼備	60 40	()	()	8/5 ()	8/中 ()	晩	やや不良	曇天、寡日照	側枝収穫中。果実、側枝の伸びやや遅い。
		富山市 (南部施設)	0.3 (見込み)		兼備2号 (埼玉原種)	80			8/中	8/下	並	並		収穫中。 曲がり果の発生少ない。
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.1	100	新藍	100	7/10		8/10		並	並	台風18号による葉先の損傷	生育良好、結球始め
		高岡	3.8	200	おきな 初美	50 20	7/上	8/中	7/下	9/上	並	並		生育順調、10月中旬より出荷予定
		小矢部 (福岡倉)	9.6	185	おきな 初恋	54 24	7/13	8/2	8/7	8/28	並	並		生育順調、10月下旬より出荷予定
		南砺市 (福光)	0.6	75	秋徳SP 湖月	60 40	6/20	7/20	7/25	8/18	平年並み	並	多雨日照不足	8/18植えは結球はじめ 早植えは出荷中であるが病害多い
		(福野)	7	140	おきな 青龍345	25 20	7/15		8/8			並	日照不足	
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	8/1		8/25		並	並	台風18号による葉先の損傷	早いものは結球中。養分欠乏と思われる中肋の褐変が見られる。
		高岡市	4.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上	8/下	8/下	9/上	並	並	台風による強風	一部で葉折れ等の被害が見られる。
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう ハートランド	50 30	7/上 ()	7/中 ()	8/上 ()	()	並	並		生育順調
		南砺市 (福光)	4	100	おはよう	100	6/13	7/27	7/16	8/下		やや不良	9月上旬の高温、多雨	早植えは収穫中
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	137	グリーンタワー アクセル	60 30	()	()	()	()	量3.4t(前年比9)	やや不良	9月の多雨	ハウス立茎栽培は10月上旬まで収穫
だいこん	夏まき	魚津市	15.4	110	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	10/2	-	-	並	並	長雨、日照不足	生育は概ね順調だが、一部で下葉の黄化や横しま症が見られる。
中小かぶ		富山市 (旧市)	4 (見込み)	100	CR鷹丸 CRもちばな	80 10	8/下	10/上			晩	やや不良	多雨 白斑病等の多発	播種作業の遅れ 白斑病等の多発
大かぶ	秋まき	富山市	9	100	CR京千舞	100	8/17	9/中	-	-	並	不良	9月下旬の長雨	8月中旬播種は、根径

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
		(婦中)												10~12cm
		高岡市	5.0	100	早生大蕪 京千舞	20 80	8/8 () ()	- () ()	- () ()	並	やや不良	台風による強風	早播きのもので、葉折れや 傷みが見られる。	
		南砺市 (福光)	3.0	100	早生大かぶ	100	8/30 9/中	-	-	平年並み	並		生育は総じて順調	
にんじん	夏まき	黒部市	1.5	150	愛紅	100	7/28 9/3			並	並		生育良好	
		富山市 (あおば全域)	7.2	121	彩誉 愛紅	50 30	7/22 8/下			並	やや不良	9月下旬の長雨	播種時期(7月下旬~8月上 旬)の根径は15~25mm	
		高岡市	7.2	80	愛紅 アロマレット	30 30	7/21 8/29 () ()	- () ()	- () ()	並	並	台風による強風	早播きのもので、葉の倒伏 が見られる。	
		砺波市 南砺市	9	110	愛紅	95	7/16 () ()	() ()	() ()			日照不足	生育の早いほ場で根腐れ症 状発生	
さといも	普通	入善・朝日	5.0	111	大和	100			4/上	並	並		生育良好	
		上市町 (見込み)	12	100	石川早生 大和	10 90			4/5 4/下 4/中 6/7	並み	並み		大和 生葉数2枚程度。一 部、枯れ上りの早い圃場が	
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 6/9 (4/19) (5/下)	並	並	台風による強風	葉の破れ、荷重が充ちれ ズ	
		小矢部 (福岡含む)	4.8	97	大和	100			4/24 5/18 (4/19) (5/10)	並	並	台風による強風	葉の破れ、荷重が充ちれ ズ	
		砺波市	2.5	83	大和	95			4/下 5/下	平年並み	並	・多雨日照不足 ・隔年栽培	10/5より共選開始	
		南砺市 (福野)	7.3	122	石川早生 大和	30 60			4/25 6/上 5/2	平年並み	並	・多雨日照不足	女早生が10/2より共選開始。 大和は10/10より共選開始予定	
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			5/2 5/下	平年並み	並	・多雨日照不足	生葉数4枚程度 共選は10/20頃予定	
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市 (見込み)	115	115	ターザン もみじ3号	95 5	8/23 9/2	10中 11上		並	発芽期の高温と9月の日照 不足	苗立率が低下 (苗立率83%)		
にんにく	普通	入善・朝日 (見込み)	0.60	100	ホワイト六片 上海早生	70 30								
		立山町	0.15	150	ホワイト6片	100			10/23の週				種球の選別中	
		南砺市 (城端)	2	111	上海早生 嘉定	75 25			10月上 10月上			多雨	ほ場が乾かず、植付作 業が遅れている。	