

## 野菜生育情報(5月10日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴	60	4/下	5/中	6/中	6/下	早	並	12月と2月の高温	トウ立ちの程度は平年並み 出荷時期が平年より早まっている
		氷見市	0.4	100	吉晴	100	4/下	5/下	6/上	7/中	並	並	12月と2月の高温	抽苔が始まっている
	坊主不知	氷見市	1.0	100	清心	100	( )	( )	9/上	9/中	並	並		生育順調
	秋まき 初夏どり	氷見市	4.3	100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/上	9/中	4/中	( )	並	並		生育順調
	秋冬	黒部市	7.0 (見込)	120	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15		3/27		並	並		一部で強風による葉先枯れ
	夏秋、秋冬	富山市 八ヶ山	3.3 (見込み)	100	夏扇4号 ホワイトスター	60 20	1/下	4/上	4/20		やや遅い			高温乾燥により、活着、初期生育が遅れている。
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/24	4/16	3/27		並み～			3月下旬、4月中旬に定植したものは、概ね順調に生育 4月下旬以降に定植したほ場では、高温乾燥により、活着、初期生育が遅れている。
	夏秋、秋冬	富山市 (大沢野)	4.1 (見込み)	100	夏扇4号 長宝	60 30	2/上	4/上	4/15	5/中	やや遅い		4～5月の強風による葉折れ	初期生育がやや遅れ
	夏秋	富山市 (大山)	2.5 (見込み)	80	長宝 夏扇4号	50 50	1/下	4/上	3/28	5/中	やや遅い		4～5月の強風による葉折れ	初期生育がやや遅れ
	夏秋、秋冬	立山町	12.0 (見込み)	92	夏扇パワー 夏扇4号	25 70	1/6	4/下	3/23	6/上	並み	並み		3/30定植苗は37cm、葉令3.5枚、9.7mm。定植は順調に進む。一部、強風の被害あり。
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	3/27	( )	並	並		
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上	3/中	3/下	4/中	並	並	4/17の強風	生育遅れ
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	4/上	( )	( )	( )	並	並		育苗順調
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下	4/中	( )	( )	並	並	4/17の強風	生育遅れ
	夏秋 秋冬	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7	( )	3/30	( )	平年並み	並	5月3日の強風による影響は	活着は良好
夏秋 秋冬	南砺市 (城端)	1.1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上	3月中	3/31	( )	平年並み	並	5月3日の強風による影響は	活着は良好。 順次定植作業が実施されている。	
短葉性ねぎ	夏秋	黒部市	1.0 (見込)	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15		3/29		並	並		一部で強風による葉先枯れ
		魚津市	1.0 (見込)	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	70 30	1/9	2/1	3/31	5/中	やや早い	並	定植後の高温(適温)と適度な降雨	定植後の生育は順調(葉鞘径11mm)
		射水市	0.8		越中ふゆ小町 越中なつ小町	50 50	1/15	( )	3/27	( )	並	並		生育順調
		砺波市 南砺市	0.55		越中夏小町 越中冬小町	50 50			3/31					定植後の乾燥で活着遅れ
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ハンター 晩中サンホープ	30 70					やや早い	並		発芽良好。生育はやや早い。
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年	-	-					春作は未播種 播種は5月中旬以降
		高岡市	8.0	100	ハンター ミラージュ	40 30	( )	( )	( )	( )	並	並		生育順調
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	浜ちゃん なつき	50 50	周年				並	並		順調に生育
		富山市 (JAなのはな)	5	100	なつき、春の選抜	50、50	周年				早い	並み	気温が平年より高め	概ね順調に生育している。 気温が高く、生育が早い
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(春まき)春のセンバツ (春まき)夏楽天	30 30	周年				並	並		生育は概ね良好

		射水市	のべ 11.0ha	100	冬里 なかまち	40 40	( ) ( ) ( ) ( )			並	並		生育順調
えだまめ		射水市	17.9 (見込み)	138	たんくろう	100	4/10 ( ) (7/19)			並			定植作業は順調
トマト	半促成	富山市	3.0	100	桃太郎75	70	1/5 1/30	3/18 4/1		早い	並み		生育が早い(5段開花) 高温により、4段目にガク 枯、花落ちが見られる。一 部で、3、4段の落果
		(富山)			桃太郎プレミアム	20							
		高岡市	0.2	100	CF桃太郎ファイト	90 10	1/中 1/下 ( ) ( )	4/11 4/下 ( ) ( )		並	並		4段開花中
		南砺市	0.4	108	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	70 30	苗購入 ( ) ( )	2/18 2/21 ( ) ( )	生育早い(収穫)	並	平均気温が平年+2度と高く 日照時間も多し。		7~8段目開花。 1段~2段目収穫中
きゅうり	半促成	朝日・入善 ・魚津	1.4	90	2号 久輝	65 20	1/21 購入苗一部あり	2/23 4/下		早い	やや良		活着、生育良好
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗	4/25 5/上		並み	並み		1番花は開花~蕾状態、5/3 ~5/6の強風で葉の折れ、 擦れが一部で見られる。
		高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30	( ) ( )	4/下 5/上 ( ) ( )		並	並	5/3の強風	葉の傷みが見られる。
すいか	トンネル早熟	入善町	4.1	101	入善ジャンボ	100	4/1 4/5	4/23		並	並		つる長30~50cm、6~8葉
キャベツ	秋まき 春どり 春まき	射水市	8.0	100	極早生732号 春ひかり7号	50 30	9/下 10/上 ( ) ( )	10/下 11/下 ( ) ( )		やや早い	並	12月と2月の高温	出荷時期が平年より早まっている
		入善町	0.3	50	YR春空	100	3/20	4/25		並	並		本葉7~8枚
		南砺市 (福光)	0.5	160	SE	100	1/22 2/下 ( ) ( )	3/8 4/12 ( ) ( )			並		結球はじめ、風の被害で欠株少々あり
		(福野)	3.2	100	初恋 おきな	60 40	( ) ( )	4上 4下 ( ) ( )			並		葉数10枚、虫害は無し
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	137	グリーンタワー アクセル	60 30	( ) ( ) ( ) ( )				4月17日、5月3日の強風により	萌芽するも、風害により収穫減少 やや不良 傷や曲がりとなり出荷減少	
だいこん	春まき	魚津市	3.0 (見込)	100	春のいぶき 夏つかさ	40 40	3/31 5/中	- -		並	並	4/17強風によるトンネル被覆の撤去 4月の好天	播種の早いもので、本葉10~11枚 強風による地際部の損傷散見
	トンネル	富山市 (なのはな)	0.3	100	天寶	100	3/25 3/27			やや早い	並み		生育は概ね順調。強風による 葉のスレ等あり。 本葉15~20葉。トンネル除去済み
	トンネル	氷見市	0.9	100	天寶 藤風	60 20	2/下 3/中 ( ) ( )	( ) ( )		並	並	4/17の強風	3月播種:生育遅れ、くびれの発生 2月播種:生育順調
にんじん	春まき	黒部市	0.3	60	向陽2号	100	4/12 4/15			やや遅い	やや不良	播種後のかん水不足	本葉1~2枚、一部発芽不良
		富山市 (あおぼ全域)	0.7	70	愛華 向陽2号	70 30	3/29 4/15	- -		並	並		子葉展開~本葉第1葉展開
		高岡市	1	100	向陽2号 アロマレット	60 20	4/13 4/20 ( ) ( )	- - ( ) ( )		並	並		本葉1枚程度 生育順調
		砺波市	0	0		100	( ) ( ) ( ) ( )						作付中止
たまねぎ	露地普通	砺波市	103	124	ターサン	95	8/20	10/12 10/28		生育旺盛	良	記録的な暖冬	生育は良好だが、抽台が発 生している
		南砺市			もみじ3号	5	( ) ( ) ( ) ( )						一部の連作地でべと病が発生
にんにく	普通	入善・朝日	0.6	100	ホワイト六片 上海早生	60 40		10/下		並	並		草丈40~60cm

さといも	普通	立山町	0.1	100	ホワイト 6片	99			10/12		並み	並み		4,5月の強風により、葉折れが2.1枚/株あり、肥大不足や病気の発生が懸念され 太さ19.4mm、葉数8.0枚、草丈70.5cm
		南砺市 (城端)	2.0	113	上海早生 嘉定	73 27	( ) ( )	( ) ( )	9/30 10/20	上海、嘉定ともに昨年より	良	5月3日の強風により、全体的に葉折れ、一部で株折れ		上海、嘉定とも生葉数8枚程度で、抽台している。
		入善・朝日	5.0 (見込)	111	大和	100			4/26		並	並		定植作業はやや遅れぎみ
		上市町	12 (見込み)	100	石川早生 大和	10 90			4/5 4/下 4/中 5/下		並み	並み		石川早生は萌芽が始まる。 大和の定植は順調に進む。
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 5上 (4/19) (5/下)		並	並		萌芽はまだみられない。
		小矢部 (福岡含む)	4.8	97	大和	100			4/24 5/中 (4/19) (5/中)		並	並	一部で植付が未完了	萌芽はまだみられない
		砺波市	2.5	83	大和	95			4/下 5/下				でマルチが剥がれる等の被害あり	天候不順により定植が遅れている。
		南砺市 (福野)	7.3	122	石川早生 大和	30 60			4/25 5/上 5/2				でマルチが剥がれる等の被害あり	石川早生は4下～5上で植付進む。 大和は5月上で植付進む。
南砺市 (井波)	16	100	大和	90			5/2 5/下				でマルチが剥がれる等の被害あり	植付は順調に進んでいる。		
ばれいしょ	春植え	魚津市	0.3 見込み	60	はるか ニシユタカ	80 20	3/24	4/中			並	並		3/24植付→5/5に第1回目培土。発蕾期。
		富山市 (なのはな、富山)	6.0	108	男爵 ニシユタカ	61 23	-	-	3/23	4/19	早い	並み	気温が平年より高め 周期的な降雨	概ね計画どおり培土作業 実施中
		射水市	0.6	40	男爵				4/6				植え付け終了 5/8培土	
スイートコーン	露地	高岡市	3.5	100	ゴールドラッシュ ピクニックコーン	60 20	4/下	5/中 ( ) ( )	( ) ( )		並	並		生育順調
		砺波市	5	100	ゴールドラッシュ86	100	4月中	4月中					5月3日の強風による影響はほとんどなし。	1回目の播種終了。 2回目は順次播種。
		南砺市 (福野)	1.3	87	バンダムピーター445	100	4/20						5月3日の強風による影響はほとんどなし。	1回目の播種終了。 2回目は順次播種。