

## 野菜生育情報(6月9日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下	5/中	6/中	6/下	早	並	12月と2月の高温	抽台の程度は平年並み 出荷時期が平年より早まっている
		氷見市	0.4	100	吉晴	100	4/下	5/下	6/上	7/中	並	並	12月と2月の高温	出荷終了
	坊主不知	氷見市	1.0	100	清心	100	( )	( )	9/上	9/中	並	並		生育順調
	秋まき 初夏どり	氷見市	4.3	100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/上	9/中	4/中	( )	並	やや不良	12月と2月の高温	羽根の一部で抽台が見られ、出荷不能
	秋冬	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/8	並	並		3/下植え「夏山」の生育早い
	夏秋、秋冬	富山市 八ヶ山	3.3 (見込み)	100	夏扇4号 ホワイトスター	60 20	1/下	4/上	4/20	( )	並み	並み		順調に生育している。 4月下旬定植で、草丈40~50cm、葉令5~6葉。
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/24	4/16	3/27	5月下旬	並み	並み		順調に生育している。 3月下旬定植で、草丈60cm、葉令6葉。
	夏秋、秋冬	富山市 (大沢野)	3.6	88	夏扇4号 長宝	60 30	2/上	4/上	4/15	5/中	並み	並み		4月末定植:草丈30~
	夏秋	富山市 (大山)	2.5	80	長宝 夏扇4号	50 50	1/下	4/上	3/28	5/中	並み	並み		4月初定植:草丈40~50cm 、葉鞘径8~10mm
	夏秋、秋冬	立山町  (見込み)	12.0	92	夏扇パワー  夏扇4号	25  70	1/6	4/下	3/23	6/上	並み	並み		3/30定植苗は65cm、葉令6.5 枚、14mm程度。一部葉先枯 れが見られる。強風の被害 からほぼ回復。
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	3/27	4/上	並	並		
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上	3/中	3/下	4/中	並	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	4/上	( )	4/1	6/上	並	並		
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下	4/中	( )	( )	並	並		生育順調
	夏秋	砺波市	8	100	関羽	70	1/7	( )	3/30	( )	平年並み	並	少雨傾向。	乾燥により、一部で葉先枯 れあり。 生葉数3~4枚程度。
夏秋	南砺市	1.1	100	ホワイトスター	80	2月上	3月中	3/31	( )	平年並み	並	少雨傾向。	乾燥により、一部で葉先枯 れあり。 生葉数4枚程度。	
秋冬	(城端)			夏扇4号	20	( )	( )	( )	( )					
短葉性ねぎ	夏秋	黒部市	1.5	136	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15	3/24	3/29	5/16	並	並		3/下植えの葉鞘長15~17cm 葉鞘径15~17mmでやや早い
		魚津市	1.0 (見込)	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	70 30	1/9	2/1	3/31	5/14	並	並		定植後の生育は順調(葉鞘 径18~20mm)
	春まき 夏どり	射水市	0.8		越中なつ小町 越中なつ小町	50 50	1/15	( )	3/27	( )	並	並		生育順調
	夏秋	砺波市 南砺市	0.1	18	越中夏小町	100			4/1	4/6		並	少雨・乾燥	定植後の乾燥により、やや生育遅れ。
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	サンホープ	70					並	並		発芽良好だが、苗立枯れ、ネキ リ等による株の消失が散見
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年		-	-	並み	並み		順次、播種され、概ね順調 に発芽、生育している。
		高岡市	8.0	100	晩抽サン ホープ	40 30	( )	( )	( )	( )	並	並		生育順調
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	なつき 浜ちゃん	80	周年				並	並		順調に生育
		富山市 (JAなのはな)	5	100	春の選抜、なつき	70、20	周年				早い	並み		概ね順調に生育している。 気温が高く、生育が早い
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(夏まき)なつき	60	周年				並	並		生育は概ね良好
		射水市	のべ 11.0ha	100	冬里 なかまち	40 40	( )	( )	( )	( )	並	並		生育順調
えだまめ		射水市	17.9 (見込み)	138	たんくろう	100	4/10	( )	(7/19)		並		生育順調	
トマト	半促成	富山市 (富山)	3.0	100	桃太郎75 桃太郎プレミアム	70 20	1/5	1/30	3/18	4/1	早い	並み	気温が平年より高め	2~3段収穫、8段開花、 6月初旬より摘心開始
		高岡市	0.2	100	CF桃太郎ファ イト	90 10	1/中	1/下	4/11	4/下	並	並		6段開花中、生育順調
		南砺市	0.4	108	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	70 30	苗購入	( )	2/18	2/21		並	平均気温が平年+2度と高く 日照時間も多い。	8日目開花。 3~4段収穫中
きゅうり	半促成	朝日・入善 ・魚津	1.4	90	シルバーハワー 2号 久輝	65 20	1/21	購入苗一部あり	2/23	4/下	早い	やや良		生育良好
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗		4/25	5/上	並み	並み		強風の被害から回復。蕾~ 開花6~8花、2~3着果。一 部、樹勢の弱い株あり。わ ずかであるが6/2から個別 販売が始まる。
		高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30	( )	( )	4/下	5/上	並	並	5/3の強風	葉の傷みが見られる。
スイカ	トンネル早熟	入善町	4.10	101	入善ジャンボ	100	4/1	4/5	4/23	5/7	並	並		つる長2~2.5m、25~30葉 5/31~交配開始
キャベツ	春まき	入善町	0.3	50	YR春空	100	3/20		4/25		並	並		玉径15cm程度
		南砺市 (福光)	0.5	160	SE	100	1/22	2/下	3/8	4/12		並		乾燥が続いたため、灌水むらにより 一部小玉傾向
		(福野)	3.2	100	初恋 おきな	60 40	( )	( )	4/上	4/下		並		収穫開始

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	137	グリーンタワー アクセル	60 30	( )	( )	( )	( )		やや不良	4月17日、5月3日の強風により 傷や曲がりとなり出荷減少	細いもの多くなり、多くの圃場で収穫打ち切りされている 6月10日で出荷終了予定	
だいこん	春まき	魚津市	3.0 (見込)	100	春のいぶき 夏つかさ	40 40	3/31	5/中	-	-	並	並		生育は順調 抽苔なし、強風被害少	
		トンネル (なのはな)	富山市	0.3	100	天宝	100	3/25	3/27			やや早い	並み	気温が平年より高め	概ね順調に生育・出荷 肥大よく、2L~3Lの比率が高い
		トンネル	氷見市	0.9	100	天宝 藤風	60 20	2/下 ( )	3/中 ( )	( )	( )	並	並		収穫中
にんじん	春まき	黒部市	0.3	60	向陽2号	100	4/12	4/15			やや遅い	やや不良	播種後のかん水不足	草丈15~20cm、本葉4~5枚 一部、発芽不揃い	
		富山市 (あおば全域)	0.7	70	愛華 向陽2号	70 30	3/29	4/15	-	-	並	並		本葉第5~7葉展開	
		高岡市	1	100	愛華 紅うらら	30 30	4/13 ( )	4/20 ( )	-	-	並	並		本葉6枚程度 雑草の発生が見られる	
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	103	124	ターサン もみじ3号	95 5	8/20 ( )		10/12 ( )	10/28 ( )	6月8日から 収穫開始	良	記録的な暖冬	記録的な暖冬により抽台発生も 収穫量は増える見込み。	
にんにく	普通	入善・朝日	0.6	100	ホワイト六片 上海早生	60 40			10/下		並	並		生育良好	
		立山町	0.1	100	ホワイト 6片	99			10/12		並み	並み		収穫期が近い。まだ、葉の 黄化は見られない。 太さ20mm、生葉数7.0枚程度	
		南砺市 (城端)	2.0	113	上海早生 嘉定	73 27	( )	( )	9/30 ( )	10/20 ( )	6/6より上海 の収穫始まる	良	さび病により葉の黄化が早 まる。	生葉数は上海で4枚、嘉定 で6枚程度である。	
さといも	普通	入善・朝日 (見込)	5.0	111	大和	100			4/26		並	並		萌芽中	
		上市町 (見込み)	12	100	石川早生 大和	10 90			4/5,4/下 4/中	6/7	並み	並み		5月中旬までの定植圃場はほぼ萌芽した。 4月下旬定植で5.5枚、25cm程度。病虫害の発生なし	
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/19)	6/9 (5/下)	並	並		葉数3~4枚	
		小矢部 (福岡含む)	4.8	97	大和	100			4/24 (4/19)	5/18 (5/10)	並	並	植え付け後の乾燥	葉数3~4枚 若干出芽不揃い	
		砺波市	2.5	83	大和	95			4/下	5/下	平年並み		萌芽揃い、本葉2枚程度	定植は終了	
		南砺市 (福野)	7.3	122	石川早生 大和	30 60			4/25 5/2	6/上	平年並み		萌芽揃い、本葉2枚程度	一部で大和の植付が続いている。	
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			5/2	5/下			萌芽揃い、本葉2枚程度	定植は終了	
ばれいしょ	春植え	魚津市	0.3 見込み	60	はるか ニシュタカ	80 20	3/24	4/中			並	並		生育順調、花終了。草丈60 ~70cm	
		富山市 (なのはな、富山)	6.0	108	男爵 ニシュタカ	61 23	-	-	3/23	4/19	早い	並み	気温が平年より高め	概ね順調に生育 灌水実施は、茎葉黄化始期、1コ芋重40~50g	
		射水市	0.6	40	男爵				4/6				植え付け終了 5/8培土		
スイートコーン	普通	高岡市	3.5	100	ゴールドラッシュ ピクニックコーン	60 20	4/下 ( )	5/中 ( )	( )	( )	並	並		生育順調	
		砺波市	5	100	ゴールドラッシュ86	100	4月中	5月下			平年並み	並		早いほ場で本葉8枚程度、 雄穂抽出	
		南砺市 (福野)	1.3	87	バンダムピーター445	100	5/2	5/20			平年並み	並		播種は終了。土寄せ、1回 目追肥終わり。生葉数8枚程度	

作柄の良否

、「良、やや良、並、やや不良、不良」の5段階とする。

調査時の生育観察により、

- 2割以上の増、減 → 良、不良
- 1割以上の増、減 → やや良、やや不良
- 変化1割以下 → 並

以上を目安とする。