

野菜生育情報(9月8日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			生育状況
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下 ()	5/中 ()	6/中 ()	6/下 ()	早	並		生育順調
		氷見市		100	吉晴	100	4/下 ()	5/下 ()	6/上 ()	7/中 ()	並	並		生育順調
	坊主不知	氷見市		100	清心	100	5月仮植		9/上 ()	9/中 ()	並	並		生育順調
	秋まき 初夏どり	氷見市		100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/18 ()	()	()	()	並	並		播種準備中
	秋冬	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/8	やや早い	並		「夏山一本太」品質良好 夏扇4号の生育やや早い
	夏秋、秋冬	富山市 八ヶ山 中央	3 6.2 (見込み)	91 100	夏扇4号 夏扇4号 夏扇パワー	60 70 20	1/下 1/24	4/上 4/16	4/20 3/27	5月下旬	並み 並み	並み 並み		順調に生育している。 順調に生育している。
	夏秋、秋冬	富山市 (大沢野)	3.6	88	夏扇4号 長宝	60 30	2/上	4/上	4/15	5/中	並	並		4月末定植が収穫開始、概ね順調
	夏秋	富山市 (大山)	2.5	80	長宝 夏扇4号	50 50	1/下	4/上	3/28	5/中	並	並		収穫中で、概ね順調
	夏秋、秋冬	立山町	12.0 (見込み)	92	夏扇パワー 夏扇4号	25 70	1/6	4/下	3/23	6/上	並み	並み		一部、葉先枯れや生育遅延圃場が見られるが、概ね順調に生育している。3回目～最終土寄せを実施中。
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上 ()	3/下 ()	3/27	4/上 ()	並	並		生育順調
		氷見市		100	夏扇パワー 源翠	50 30	2/上 ()	3/中 ()	3/下 ()	4/中 ()	並	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	4/上 ()	()	4/1	6/上 ()	並	並		生育順調
		氷見市		100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下 ()	4/中 ()	()	()	並	並		生育順調
	夏秋 秋冬	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7 ()	()	3/30 ()	()	平年並み	並	高温多湿	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。
	夏秋 秋冬	南砺市 (城端)	1.1	100	ホワイスター 夏扇4号	80 20	2月上 ()	3月中 ()	3/31 ()	()	平年並み	並	高温多湿	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。
	短葉性ねぎ	夏秋	黒部市	1.5	136	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15	3/24	3/29	5/16	並	並	
夏秋		魚津市	0.9	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	15 85	1/9	2/1	3/31	5/14	並	並		出荷終了
夏秋		砺波市 南砺市	0	18	越中夏小町	100			4/1	4/6		並		一部で収穫遅れ
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ミラージュ ハンター	50					並	並		概ね順調
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100	アクティブ サマーズ	20 20	8下		-	-				8月下旬まきで本葉3~4枚
		高岡市	8.0	100	ミラージュ	80	()	()	()	()	並	並		生育順調
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	なつき のりちゃん	50	周年				並	並	高温・乾燥	生育は順調。一時、乾燥によると思われる芯枯れが見られたが、現在はない。一部でカッピングが見られる。
		富山市 (JAなのはな)	5	100	春の選抜、なつき、	70、20	周年				並	並		概ね順調に生育している。
	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なつき	60	周年				並	並		生育は概ね良好	
	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なつき	60	周年				並	並		生育は概ね良好	
	射水市	のべ 11.0ha	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	-	並	並		生育順調
えだまめ		射水市	17.9 (見込み)	138	たんくろう	100	4/9		-	-	並	並		生育順調
きゅうり	抑制	朝日・入善 ・魚津	0.6	100	ズバリ163 フレスコ100	50 30	7/5		7/22		並	並		生育良好
		富山市 (八ヶ山)	0.8 (見込み)		T-178	60 40	()	()	8/5	8/中 ()		並		8月25日頃、主枝収穫開始、主枝低段収穫中
		富山市 (南部施設)	0.3 (見込み)		兼備 兼備2号 (埼玉原種)	80			8/中	8/下		並	高温乾燥による活着遅れ。	生育は回復傾向。 病害虫の発生少ない。

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗		4/25	5/上	並み	並み		着果(花)数が8月より減少。樹勢が落ちている圃場が一部にあり。	
		高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30	() ()	() ()	4/下	5/上	並	並		生育順調	
キャベツ	夏まき	入善町	1.1	100	新藍	100	7/11		8/10		並	良		生育良好、結球始め	
		高岡	3.8	200	おきな 初美	50 20	7/上	8/中	7/下		並	並		7下定植結球始期、生育順	
		小矢部 (福岡含)	9.6	185	おきな 初恋	54 24	7/13	8/2	8/7	8/28	並	並		生育順調	
		南砺市 (福光)	0.6	75	秋徳SP 湖月	60 40	6/20	7/20	7/25	8/18	平年並み	並	高温乾燥	早植えは結球期	
		南砺市 (福野)	7	140	おきな 青龍345	25 20	7/15		8/8				高温乾燥	8/8から定植開始	
はくさい	夏まき	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	8/1		8/25		並	並	少雨	早いもので本葉10枚目展開中 一部で、定植後の少雨による活着遅れ	
		高岡市	4.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上	8/下	8/下		並	並		定植中。	
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう ハートランド	50 30	7/上	7/中	8/上	() ()	並	並		定植後の生育は順調	
		南砺市 (福光)	4	100	おはよう	100	8/13	7/27	7/16	8/下			高温乾燥	早植えは発蕾はじめ	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	137	グリーンタワー アクセル	60 30	() ()	() ()			出荷量3.4t(前 年比97%)	やや不良	4月17日、5月3日の強風により 傷や曲がりとなり出荷減少	立茎中 露地は6月10日で出荷終了	
だいこん	秋冬どり	魚津市	13.0 (見込)	100	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	9/20頃	-	-	並	並		早いもので、根径4cm、葉 数20枚程度と順調に生育	
中小かぶ		富山市 (旧市)	4 (見込み)	100	CR鷹丸 CRもちばな	80 10	8月下旬					並		8月下旬まきで本葉3~6枚	
大かぶ	秋まき	富山市 (婦中)	9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/17	9/中	-	-	並	並		8月中旬播種の生育 は順調(本葉6~7枚)	
		高岡市	5.0	100	早生大蕪 京千舞	20 80	8/8		-	-	並	並		播種ほぼ終了。 発芽は並。	
		南砺市 (福光)	3.0	100	早生大かぶ	100	8/30	9/中	-	-				播種直後	
にんじん	夏まき	黒部市	1.5	150	愛紅	100	7/28	9/3			並	やや不良	播種後のかん水不足	発芽不揃い、雑草多い	
		富山市 (あおぼ全域)	7.2	121	彩誉 愛紅	50 30	7/22	8/下			並	並		本葉1枚展開~7枚展開	
		高岡市	7.2	80	愛紅 アロマレッド	30 30	7/21	8/29	-	-	並	並		高温乾燥により、発芽率低 雑草の発生多い	
		砺波市	9	110	愛紅	95	7/16		() ()	() ()				8月2日の集中豪雨によって 土壌表面がクラスト化	発芽は昨年並み(やや低い) 8月2日以前播種で発芽率 低下、一部でキャツグサ発生
さといも	普通	入善・朝日	5.0	111	大和	100			4/上		並	並		草丈100~130cm	
		上市町	12	100	石川早生	10			4/5	4/下	並み	並み		大和 5月上旬定植圃場で 草丈130cm程度、生葉数 3.5枚程度。一部、生育停滞 している圃場があるが、概 ね順調に生育している。	
		(見込み)			大和	90			4/中	6/7					
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中	6/9	(4/19)	(5/下)	並	並	生育順調
		小矢部 (福岡含む)	4.8	97	大和	100			4/24	5/18	(4/19)	(5/10)	並	並	生育順調
		砺波市	2.5	83	大和	95			4/下	5/下	平年並み		高温多湿	草丈130cm程度。	
		南砺市 (福野)	7.3	122	石川早生 大和	30 60			4/25	6/上	平年並み		高温多湿	石川早生が9/4から共選開始。 大和は草丈130cm程度。	
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			5/2	5/下	平年並み		高温多湿	草丈120cm程度。	
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	130 (見込み)	130	ターザン もみじ3号	95 5	8/23	9/2	10中	11上		並	かん水ムラ	一部で発芽ムラ	
プチヴェール	冬どり	入善・朝日	0.2 (見込)	100	プチヴェール	100			8/12	9/6	並	並		生育良好、草丈15~20cm	