

野菜生育情報(10月10日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨 年 比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	9.5	123	夏扇4号	60	1/16	4/5	3/31	6/10	やや遅い	並		「夏扇4号」の伸長遅い	
		富山市 八ヶ山 中央	2.6 (見込み) 6.2 (見込み)	78 100	夏扇4号 ホワイトスター 夏扇4号 夏扇パワー	60 20 70 20	1/27 () 1/17 (1/15)	4/10 () 4/2 (4/5)	4/24 () 3/31 (3/27)	5/30 () (5/16)	並 並	並 並		生育は概ね順調 収穫中で、概ね生育順調	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 (大沢野)	3.3	80	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/27 (2/10)	4/10 (4/10)	4/20 (4/15)	5/20 (5/15)	並	並		収穫中で、概ね順調	
		富山市 (大山)	2.0	80	夏扇4号 長宝	80 20	1/23 (1/20)	4/10 (4/10)	4/1 (3/28)	5/8 (5/10)	並	並		収穫中で、概ね順調	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	立山町	13.0 (見込み)	100	夏扇パワー 夏扇4号	20 70	1/6 (1/6)	4/20 (4/25)	3/30 (3/23)	6/10 (6/5)	並	並		収穫のピーク近づく。 7,8月の多雨により生育停滞圃場あり。	
		射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	4/1	4/中	並	並		生育順調	
	春まき 秋冬どり	氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上 (2/上)	3/中 (3/中)	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	並	やや不良		湿害による生育不良は回復 傾向	
		射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下	4/中	4/中	5/上	並	並		生育順調	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/下 (2/下)	3/中 (3/中)	4/中 (4/中)	4/下 (4/下)	並	やや不良		湿害による生育不良は回復 傾向	
		砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7		3/30		並	やや不良	8月の多雨・寡日照		
	ハウス白ねぎ	春まき 冬どり (施設)	入善町・朝日町	1.6	100	ホワイトスター		5/27		6/23		並	並		生育順調
			富山市(婦中他)	0.12		森の奏で		4/下		6/中		並	並		生育順調
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4	100	ハンター ミラージュ	50	周年		-	-	並	並		生育順調	
		富山市 (富山)	3	100	ミラージュ		周年		-	-	並	並		生育順調	
		高岡市	11.0	100	ハンター	80	周年		-	-	並	並		生育順調	
こまつな	周年	魚津市	1.5	149	のりちゃん 浜ちゃん	40 40					並	並		生育順調	
		富山市 (JAなのはな)	5	100	優翠 一部品種試験	90 10	周年				並	並		生育順調	
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なつき SC9-022 春のセンバツ	40 10 30	(周年)				並	並		生育順調	
		射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調	
きゅうり	抑制	朝日・入善	0.6	100	スバリ163 フレスコ100	50 30	7/上		7/下		並	並		生育順調	
		富山市 (八ヶ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	70 30			7/14 (8/5)	8中 (8/22)	並	並		生育順調	
		富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	66	兼備2号	90			8/10	8/20	並	並		生育順調 孫づる、ひ孫づる収穫	
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.3	100	新藍	100	7/8		8/10		並	並		生育順調 一部で活着不良発生	
		富山市 (JAなのはな)	3.8	115	輝吉 おきな	20 80	7/10	7/27	8/5	9/2	遅		8月の多雨による定植の遅れ	8月上旬定植は生育順調 8月中下旬定植で、生育遅れ気味	
	夏まき 秋冬どり	高岡	4.2	110	おきな 初美	50 30	7/5 (7/上)	8/11 (7/下)	8/1 (7/下)	8/30 (9/中)	並	並		生育順調	
	夏まき 秋冬どり	小矢部 (福岡倉)	15.8	161	おきな 輝吉	61 39	7/7 (7/13)	7/31 (8/2)	7/29 (8/7)	9/1 (8/28)	並	やや良		生育順調	
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光) (福野)	0.8 6	130 86	秋徳SP おきな 青龍345	60 20 20	6/15	7/20	7/10	8/29	並	並	8月の多雨	早植えは小玉傾向	
カンカン キャベツ	夏まき 冬どり	高岡市	0.8		夢ごろも		7/下		8/17	8/18	並	並		生育順調	

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	7/29	8/下	8/28	9/22	やや早い	並	適度な降雨	生育は順調。早いものは出荷間近。
	夏まき 秋冬どり	高岡市	1.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上 (8/上)	8/下 (8/下)	8/下 (8/下)	9/中 (9/上)	並	並		生育順調
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう ハートランド	50 30	7/上	7/中	8/上		並	並		生育順調 9月下旬から収穫開始
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	4	100	おはよう	100	7/2	7/26	8/2	9/5	並	並	8月の多雨	生育順調 9月下旬から収穫開始
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30								立茎中 露地は6月19日でお荷終了 <small>生育は概ね順調、一部で湿害等による下葉の黄化や生育ムラが見られる</small>
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	14.1	92	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	9/27	-	-	並	並	長雨、日照不足	
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100	碧寿 CR鷹丸	90 10	8/21 (8/19)	(10/5)					気温平年並、晴れ続く	8月下～10月に順次播種 生育順調
大かぶ	露地 夏まき	富山市 (婦中)	9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/15 (8/14)	9/10 (9/6)			やや遅い	並	8月の多雨による播種の遅れ	8月中旬播種は、根径 10～12cm
	露地 夏まき	高岡市	6.8	100	早生大蕪 京千舞	20 80	8/10 (8/8)	9/25	-	-	並	並		生育順調
	露地 夏まき	南砺市 (福光)	2.5	83	早生大かぶ	100	8/22	9/中	-	-	並	並		生育は総じて順調 早まきで球の直径9cm
にんじん	夏まき	黒部市	1.1	110	愛紅 彩誉	75 25	8/3	9/5			並	並		一部雑草多発で生育遅延
	夏まき	富山市 (あおば全域)	8.8	120	彩誉 愛紅	50 40	7/20 (7/22)	8/29 (8/19)			やや遅い	並	8月の多雨	播種時期(7月下旬～8月上旬)の根径は10～45mm
	夏まき	高岡市	8.3	115	彩誉 愛紅	40 30	7/19 (7/21)	8/28 (8/29)	-	-	並	やや不良	8月の多雨	一部で株立ち率が低くなっているが、生育は順調。
	夏まき	砺波市	15	190	愛紅 紅ひなた	85 15	7/16	9/上			早	不良	8月の多雨・寡日照	発芽率53%と低下、肥大早く、出荷期が早まる。
カンカン にんじん	夏まき	高岡市 射水市	0.7		彩誉、愛紅		8/21	8/28					8月の多雨	一部で株立ち率が低くなつ
さといも	普通	入善・朝日	4.2	84	大和	100			4/上		並	並		生育順調
	普通	上市町 (見込み)	11.5	96	大和	98			4/3 (4/5)	6/10 (6/7)	並	並		茎葉の黄化始まる。着果芋はやや少ない傾向
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/中)	5/下 (6/9)	並	並		生育順調、一部で掘取りが始まっている。
	普通	小矢部 (福岡含む)	4.7	94	大和	100			4/24 (4/24)	5/下 (5/中)	並	並		生育順調
	普通	砺波市	2.5	100	大和	95			5/4	5/下	並	並	8月の多雨	9/27より共選開始 生葉数3～4枚
	普通	南砺市 (福野)	7.3	100	石川早生 大和	30 60			4/15 4/下	6/上	並	並	8月の多雨	早生:8/27から個別、9/4から共選 大和:10/9より共選開始、10日出荷
	普通	南砺市 (井波)	16	100	大和	90			4/下	5/下	並	並	8月の多雨	生葉数2枚程度 草丈90～100cm 共選は10/20頃予定
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市 (目標)	190	161	ターザン もみじ3号	90 10	8/24	9/6	10中	11上		並	安定した天候	発芽率99% 苗立率96%
プチヴェール	冬どり	入善町・朝日町	0.2	100	プチヴェール	100			8/中	9/上	並	並		生育良好、草丈40～60cm