

野菜生育情報(6月8日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下	5/下	(6/中)	(6/下)	並	並		収穫終了
		氷見市	0.4	100	吉晴	100	4/下 (4/下)	5/下 (5/下)	6/上 (6/上)	7/中 (7/中)	並	並		出荷終了 定植中
	坊主不知	氷見市	1.0	100	清心	100	()	()	9/上 (9/上)	9/中 (9/中)	並	並		出荷終了
	秋まき 初夏どり	氷見市	4.3	100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/上 (9/上)	9/中 (9/中)	10/中 ()	11/上 ()	並	やや不良		抽台の発生
	春まき 秋冬どり	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/10	並	並		3/下植え「夏山」の生育早い 排水不良部分の生育遅い
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	3.3 (見込み)	100	夏扇4号 ホワイトスター	60 20	1/27 ()	4/10 ()	4/24 ()	5/30 ()	並			4月下旬定植:草丈約40cm 葉鞘径6~10mm
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/17 (1/15)	4/2 (4/5)	3/31 (3/27)	(5/16)	並			一部で葉先枯れが見られる。 4月下旬定植:草丈約40cm、葉鞘径6~10mm
		富山市 (大沢野)	3.3	80	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/27 (2/10)	4/10 (4/10)	4/20 (4/15)	5/20 (5/15)	並			4月末定植:草丈25~ 30cm、太さ5mm
		富山市 (大山)	2.0	80	夏扇4号 長宝	80 20	1/23 (1/20)	4/10 (4/10)	4/1 (3/28)	5/8 (5/10)	並			4月初定植:草丈40~50cm 、太さ8~10mm
	春まき 夏秋どり	立山町	13.0 (見込み)	100	夏扇パワー 夏扇4号	20 70	1/6 (1/6)	4月下旬 (4/25)	3/30 (3/23)	6月上旬予定 (6/5)	並			葉先枯れが一部で見られる。 4/1定植、草丈約60cm、生葉数 約4.5枚、太さ約15mm
		射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	4/1	4/中	並	並		生育順調
	春まき 夏秋どり	氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上 (2/上)	3/中 (3/中)	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	並	並		生育順調
		射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	3/下	4/中	4/中	5/上	並	並		生育順調
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	()	()	並	並		生育順調
		砺波市	8	100	関羽	70	1/上		3/31		平年並み	並		生葉数5枚
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	南砺市 (城端)	1	91	ホワイトスター 夏扇4号	80 15	2月上 ()	3月中 ()	4/2 ()		平年並み	並		草丈60cm、生葉数5.5枚
		黒部市	1.5	136	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15	3/24	3/29	5/16	並	並		生育肥大は昨年より遅い 「なつ小町」に葉先枯れ多い 生育は順調(葉鞘径17mm程 度)
		魚津市	1.1 (見込)	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	70 30	1/9	2/25	3/31	5/18	並	並		生育順調
ほうれんそう	周年	射水市	0.8		越中なつ小町	50	1/15		3/27		並	並		生育順調
		魚津市	0.4 (見込)	100	サンホープ	70					並	並		順調に生育
こまつな	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年							順次、播種され、概ね順調 に発芽、生育している。
		高岡市	11.0	100	晩抽サンホープ ジャスティス	40 30	()	()	()	()	並	並		ハウス・露地とも生育順調
		魚津市	0.4 (見込)	100	なつき 浜ちゃん	80	周年				並	並		順調に生育
		富山市 (JAなのはな)	5	100	春のセンバツ(播種中)	100	周年				並	並	気温が平年より高めで推移	概ね順調に生育している。
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(夏まき)なつき	40	(周年)				並	並		生育は概ね良好
		射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並	5月の高温時にハウス内の乾き やすい場所で「焼け」が発生。	生育順調
トマト	半促成	富山市 (富山)	2.3	77	桃太郎75 桃太郎T-93	61 14	(1/5)	(1/30)	3/18 (3/18)	4/12 (4/1)	並	並		2~3段収穫、7.8段開花 6月初旬より摘心開始
		高岡市	0.9	100	CF桃太郎ファイト 桃太郎8	90 10	1/中 (1/中)	1/下 (1/下)	4/10 (4/11)	(4/下)	並	並		4~7日目開花中 1段目直売で出荷中
		南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	60 40	苗購入 ()	()	2/18 ()	3/下 ()	早(収穫はじめ が平年より1週 間早い)	並		10段目着果 芯止め 5段収穫中
きゅうり	半促成	朝日・入善 ・魚津	0.8	60	シルバーパワー 兼備	70 5	1/下 購入苗一部あり		2/28	4/中	早い	やや良		生育良好
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗		4/24 (4/25)	5/7 (5月上旬)	並	並		6/4から収穫が始まったが石ナシ、変形果 が多い。生育不良株がなく、順調に生育 中。
		高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30	()	()	4/下 (4/下)	5/上 (5/上)	並	並		5月の乾燥で果実の肥大が やや悪い
すいか	トンネル早熟	入善町	4.1	101	入善ジャンボ	100	4/1	4/5	4/23	5/7	並	並		つる長2~2.5m、葉長18~23cm 交配5/29~、果長5~10cm
キャベツ	秋まき 春どり	入善町	0.1	30	YR春空	100	3/20		4/25		並	並		玉径15cm程度
		南砺市 (福光)	0.4	80	SE	100	1/20 ()	3/下 ()	3/8 ()	4/23 ()	こより生育遅れ	並		結球始め~中期。乾燥によ り一部小玉傾向
		(福野)	2	67	初恋 おきな	60 40	()	()	4上 ()	()		並		6/12頃より収穫予定
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30	()	()	()	()		やや不良	多くの圃場で収穫打ち切り。6 月7日で春どり出荷終了	

※収穫可能な場合のみ

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
だいこん	トンネル	魚津市	3.0 (見込)	100	春のいぶき 夏つかさ	40 40	4/3	5/18	-	-	やや遅い	並	トンネル被覆面積の減少	生育は順調 抽苔なし
	トンネル	富山市 (なのほな)	0.3	100	天寶	100	3/23 (3/25)	3/27 (3/27)	()	()	並	並	気温が平年より高め	概ね生育順調 2L~3L中心の出荷
	トンネル マルチ	氷見市	0.9	100	天寶 藤風	60 20	2/下 (2/下)	3/中 (3/中)	()	()	並	並		生育は概ね順調。
にんじん	春まき	富山市 (あおぼ全域)	0.3	40	向陽2号 紅うらら	70 30	3/26 (3/29)	4/10 (4/15)	()	()	並	並		本葉第4~6葉展開
		高岡市	0.5	83	紅うらら	100	4/14 (4/15)	4/14 (4/22)	()	()	並	並		本葉4~5枚、草丈20cm 生育順調
		砺波市	0.3	0	べにうらら	100	4/14 ()	()	()	()		並		草丈20cm、葉数4.1枚
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	118	115	ターサン もみじ3号	95 5	8/20 ()	()	10/15 ()	11/12 ()	6月3日から 収穫開始	良	暖冬	5月下旬より肥大進む。例 年より1週間程度収穫早まる。
にんにく	普通	入善・朝日	0.6	100	ホワイト6片 上海早生	60 40			10/下		並	並		生育良好
		立山町	0.1	100	ホワイト6片 ジャンボ	80 20			11/13 (10/12)		並	不良	腐敗した種球の除去が不十分であった	収穫終了(ホワイト6片) 葉の黄化はまだ。生葉数7枚程度。太さ20mm程度(ジャンボ)
		南砺市 (城端)	2.0	113	上海早生 嘉定	73 27	()	()	9/30 ()	()	6/4より嘉定の収穫 始まる。来週から上 海早生の出荷が始ま	並		生葉数5~7枚、下葉が2~3枚枯れ始め。
さととも	普通	入善・朝日	5.0 (見込)	100	大和	100			4/3		並	並		萌芽中
		上市町	11.5 (見込み)	96	大和	100			4/3 (4/5)	6月10日予定 (6/7)	並			欠株もなく、順調に発芽、生育が 進む。5月上旬定植株、生葉数 2.8枚、葉数3.6枚、草丈15.8cm
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/中)	5/下 (6/9)	並	並		萌芽はじめ
		小矢部 (福岡含む)	4.7	94	大和	100			4/24 (4/24)	5/下 (5/中)	並	並		葉数2~4枚
		砺波市	2.5	100	大和	95			4/下		平年並み	並		生葉数2枚 マルチにあたり、1枚目で葉枯がみられる
		南砺市 (福野)	7.3	100	石川早生 大和	30 60			4/15 4/下		平年並み	並		早生は生葉数2~3枚、草丈22cm 大和は生葉数2~3枚、草丈15cm
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			4/下	5/中		並		生葉数2枚、草丈10cm
ばれいしょ	春植え	魚津市	0.2 見込み	70	はるか ニシュタカ	80 20	3/26				並	並		生育順調、開花中。
		富山市 (なのほな、富山)	6.0	100	男爵 ニシュタカ	60 21			3/25 (3/24)	4/8 (4/19)	並	並	碎土率低い圃場で萌芽遅れ	概ね生育順調。
		射水市	1.4	169%	男爵 とうや				-	-	3/20	4/中	並	並

作柄の良否

、「良、やや良、並、やや不良、不良」の5段階とする。

調査時の生育観察により、

2割以上の増、減 → 良、不良
1割以上の増、減 → やや良、やや不良
変化1割以下 → 並

以上を目安とする。