

## 野菜生育情報(8月8日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要					
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況		
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/8	並	並		夏山一本太の生育早い。 夏扇4号で生育バラツキあり		
		富山市 八ヶ山 中央	3.3 (見込み) 6.2 (見込み)	100 100	夏扇4号 ホワイトスター 夏扇4号 夏扇パワー	60 20 70 20	1/27 ( ) 1/17 (1/15)	4/10 ( ) 4/2 (4/5)	4/24 ( ) 3/31 (3/27)	5/30 ( ) ( ) (5/16)	並 並	並	7月下旬の多雨、梅雨明け 後の高温	4月下旬定植:草丈70~ 80cm、葉鞘径12~18mm。 一部で湿害による生育不良 あり。 4月下旬定植:草丈約70~80cm 葉鞘径15mm 4月末定植:草丈70~ 80cm、葉鞘径10~12mm 4月初定植:草丈70~80cm 、葉鞘径12~15mm 葉先枯れがまだ一部で見られる。 4/1定植株、草丈約100cm、生 葉数約5.0枚、太さ約24mm、8 月中旬出荷予定。7月の多雨に より生育停滞圃場が一部であ り。		
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	4/1	4/中	並	並		生育順調		
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上 (2/上)	3/中 (3/中)	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	並 並	並		一部のほ場で湿害による生 育遅滞		
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下	4/中	4/中	5/上	並	並		生育順調		
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/下 (2/下)	3/中 (3/中)	4/中 (4/中)	4/下 (4/下)	並 並	並		一部のほ場で湿害による生 育遅滞		
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7 ( )	( )	3/30 ( )	( )	並	並		草丈80cm、生葉数4枚程 度。		
		南砺市 (城端)	1	91	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上 ( )	3月中 ( )	4/2 ( )	( )	並	並		草丈95cm、生葉数6枚程 外葉の萎れが目立つ		
	短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	黒部市	1.5	136	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15	3/24	3/29	5/16	並	並		7~8月どり終了	
			魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	15 85	1/9	2/25	3/31	5/18	並	並	定植以降の高温(適温)	葉鞘の伸び・太りともに良 好 8月中旬に出荷終了の見込み	
			射水市	0.8	100	越中ふゆ小町 越中なつ小町	50 50	1/15		3/27		並	並		出荷終了	
	ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	サンホープ	70					並	並	高温乾燥	かん水ムラによる生育不良 が散見される	
			富山市 (富山)	3 (見込み)	100					周年					高温	高温による初期生育の不良が見られる。
			高岡市	11.0	100	ミラージュ	80	( )	( )	( )	( )	並	並		高温期となりの作付は減少 傾向	
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	なつき 浜ちゃん	80	周年				並	並		順調に生育		
		富山市 (JAなのはな)	5	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		順調に生育		
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(夏まき)なつき S C 9 - 0 2 2	40 40	(周年)				並	並		順調に生育 雑草少発生(スベリヒユ等)		
		射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		並 高温で生育スピードが緩慢		
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	24.2	138%	たんくろう	100	4/4	7/中	-	-	並	並	7月の大雨と冠水	一部(下村・新湊地区)で冠 水したほか、その他の地域 でも、下葉の黄化が見られ る。		
きゅうり	抑制	入善・朝日	0.6	100	スハリ163 フレスコ100	50 30	7/上		7/下		並	並		順調に生育		
		富山市 (八ヶ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	70 30			7/14 (8/5)	(8/22)	並	並		8/4から本格的に定植始まる。		
		富山市 (南部施設)	0.3 (見込み)	100	兼備2号	80			8/10	8/20	並	並		育苗中、生育概ね良好		
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗		4/24 (4/25)	5/7 (5月上旬)	並	並		順調に生育		
		高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30	( )	( )	4/下 (4/下)	5/上 (5/上)	並	並		順調に生育		
すいか	トンネル早熟	入善町	4.6	112	入善ジャンボ	100	4/1	4/5	4/23	5/7	並	やや不良	6月の低温、7月の大雨	肥大不足と生育のバラツキあり 2番果収穫8/2~		
だいこん	トンネル	魚津市	12.0 (見込)	100	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1		-	-	並	並		播種の早いものは発芽		
にんじん	春まき	黒部市	1.2	120	愛紅	100	8/3							現在、発芽はみられない。 畦間かん水実施中		
		富山市 (あおば全域)	8.8 (見込み)	120	彩誉 愛紅	50 40	7/20 (7/22)	(8/19)			並	並		発芽始め~本葉1枚展開、		
		高岡市	8.7 (見込み)	120	彩誉 愛紅	40 30	7/19 (7/21)	(8/29)	( )	( )	並	並		7月下旬の降雨により、播 種作業が遅れている。		
		砺波市	8	100	愛紅	100	7/16		( )	( )	並	並	7月下旬の大雨	7月20日前に播種したほ場 で、クラスト化による発芽不 良により一部まき直し		

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
さといも	普通	入善・朝日	4.2	84	大和	100			4/上		並	並		草丈60~90cm
		上市町	11.5 (見込み)	96	大和	100			4/3 (4/5)	6/10 (6/7)	並	並		5月上旬定植株、生葉数5.3枚、 葉令12.5枚、草丈約90cm
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/中)	5/下 (6/9)	並	並		草丈1m程度、生育順調
		小矢部 (福岡含む)	4.7	94	大和	100			4/24 (4/24)	5/下 (5/中)	並	並		草丈1m程度、生育順調
		砺波市	2.5	100	大和	95			5/4	5/下	並	並		生葉数5枚程度、葉柄長約95cm。
		南砺市 (福野)	7.3	100	石川早生 大和	30 60			4/15 4/下	6/上	並	並		生葉数5枚程度、葉柄長約110cm。 生葉数5枚程度、葉柄長約100cm。
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			4/下	5/中	並	並		生葉数3枚程度、葉柄長約70cm。