

野菜生育情報(9月6日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨 年 比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	9.5	123	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/16	4/5	3/31	6/10	やや遅い	並		「夏山一本太」葉先枯れ多 「夏扇4号」一部生育ムラ	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 ハケ山	2.6 (見込み)	78	夏扇4号	60	1/27	4/10	4/24	5/30	並	並	7~8月の多雨	4月下旬定植が8/27より収穫開始 8月末から軟腐病が目立つ。	
		中央	6.2 (見込み)	100	ホワイトスター 夏扇4号 夏扇パワー	20 70 20	() 1/17	() 4/2	() 3/31	() (3/27)	() (5/16)	並	並	7~8月の多雨	4月下旬定植で、9/3より共選 出荷開始。
		富山市 (大沢野)	3.3	80	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/27 (2/10)	4/10 (4/10)	4/20 (4/15)	5/20 (5/15)	4日ほど遅い	並	7~8月の多雨	4月末定植が9/12に収穫開 始、概ね順調	
		富山市 (大山)	2.0	80	夏扇4号 長宝	80 20	1/23 (1/20)	4/10 (4/10)	4/1 (3/28)	5/8 (5/10)	並	並	7~8月の多雨	収穫中で、概ね順調	
		立山町	13.0 (見込み)	100	夏扇パワー 夏扇4号	20 70	1/6 (1/6)	4/20 (4/25)	3/30 (3/23)	6/10 (6/5)	並	並		4月下旬までの定植圃場は出荷開始中。 7.8月の多雨により生育停滞圃場が一部であり。	
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	4/1	4/中	並	並		生育順調	
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上 (2/上)	3/中 (3/中)	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	並	やや不良	7~8月の多雨	一部のほ場で湿害による生 育遅滞	
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下	4/中	4/中	5/上	並	並		生育順調	
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/下 (2/下)	3/中 (3/中)	4/中 (4/中)	4/下 (4/下)	並	やや不良	7~8月の多雨	一部のほ場で湿害による生 育遅滞	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7		3/30		並	やや不良	7~8月の多雨	草丈100cm、生葉数5枚 程度	
		南砺市 (城端)	1	91	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上 ()	3月中 ()	4/2 ()		並	並	7~8月の多雨	草丈90cm程度、生葉数5枚 程度	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.5	149	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/16	3/24	3/26	5/18	並	並		9月どり終了間近	
	春まき 夏秋どり	魚津市	0.9	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	15 85	1/9	2/1	3/31	5/14	並	並		出荷終了	
ハウスねぎ	冬どり	入善・朝日	1.6	100	ホワイトスター 龍ひかり1号	95 5	5/27		6/23		並	並		生育順調	
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ミラージュ ハンター	80					並	並		概ね生育順調	
	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100	サンホープセブン		周年						7月の高温	7月播種で高温による発芽不良 葉焼け見られる。	
	周年	高岡市	11.0	100	ミラージュ	80	- ()	- ()	- ()	- ()	並	並		8月中旬ごろから播種が行 われている。生育順調	
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	なつき のりちゃん	50	周年				並	並		概ね生育順調	
	周年	富山市 (JAなのはな)	5	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		概ね生育順調 10月から優翠に切り替え予定	
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(夏まき)なつき SC9-022 春のセンバツ	40 30 10					並	並		概ね生育順調	
	周年	射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		概ね生育順調	
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	24.2	138	たんくろう	100	4/4	7/中	-	-	並	並			
きゅうり	抑制	朝日・入善	0.6	100	ズバリ163 フレスコ100	50 30	7/上		7/下		並	並		生育順調	
	抑制	富山市 (ハケ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	70 30			7/14 (8/5)	8中 (8/22)	並	並		8月下旬から主枝収穫開始	
	抑制	富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	66	兼備2号	90			8/10	8/20	並	並		主枝収穫開始。	
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗		4/24 (4/25)	5/7 (5/10)	並	並		着果(花)数が8月より減少。 樹勢が落ちている圃場が一 部にあり。	
	露地	高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30	() ()		4/下 (4/下)	5/上 (5/上)	並	並		収穫ほぼ終了	
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.3	100	新藍	100	7/8		8/10		並	並		一部、活着不良	
	夏まき 秋冬どり	富山市 (JAなのはな)	3.8	115	輝吉 おきな	20 80	7/10	7/27	8/5	9/2	遅		8月の多雨	8月上旬定植で、本葉約20枚 降雨で定植遅れる。	
	夏まき 秋冬どり	高岡	4.2	110	おきな 初美	50 30	7/5 (7/上)	8/11 (7/下)	8/1 (7/下)	8/30 (9/中)	並	並		生育順調	
	夏まき 秋冬どり	小矢部 (福岡含)	15.8	161	おきな 輝吉	61 39	7/7 (7/13)	7/31 (8/2)	7/29 (8/7)	9/1 (8/28)	並	並		生育順調	
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	0.8	130	秋徳SP おきな	60 20	6/15	7/20	7/10	8/29	やや遅い	やや不良	8月の多雨・寡日照	早植えは結球期(外葉小さい)	
		南砺市 (福野)	6	86	おきな 青龍345	25 20	7/上		8/上		やや不良		8月の多雨・寡日照	ほ場準備ができず、予定の 面積が定植できなかった。	
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	7/29	8/下	8/28		並	並		早いもので本葉8枚目展開 中活着は良好	
	夏まき 秋冬どり	高岡市	1.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上 (8/上)	8/下 (8/下)	8/下 (8/下)		並	並		定植中	

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう ハートランド	50 30	7/上	7/中	8/上		並	並		生育順調
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	4	100	おはよう	100	7/2	7/26	8/2	9/5		やや不良	うね立て時の多雨	早植えは葉数 12枚 遅植えはうね立てが遅れ、 徒長苗を定植
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	13.0 (見込)	100	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	9/20頃	-	-	並	並		早いのもで葉長30cm、葉数 15枚程度となっている
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100	CRもちばな CR白涼	70 30	(8/19)	(10/5)					8月の多雨	8月下旬から順次播種
大かぶ	露地 夏まき	富山市 (婦中)	9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/15 (8/14)	(9/6)			7日ほど遅い	並	8月の多雨による播種の遅れ	発芽始め～本葉3枚展開、
	露地 夏まき	高岡市	6.8	100	早生大蕪 京千舞	20 80	8/10 8/8	()	()	()	並	並		多雨により播種作業が遅れている。
	露地 夏まき	南砺市 (福光)	2.5	83	早生大かぶ	100	8/22	9/中	-	-		並		早く播種した圃場は葉数3枚 発芽は概ね良好
にんじん	夏まき	黒部市	1.2	120	愛紅 彩誉	75 25	8/3 9/5	8/14			並	並		発芽良好、1戸で雑草多
	夏まき	富山市 (あおば全域)	8.8	120	彩誉 愛紅	50 40	7/20 (7/22)	8/29 (8/19)			10日ほど遅い	並	8月の多雨による播種の遅れ	発芽始め～本葉5枚展開、
	夏まき	高岡市	8.7 (見込み)	120	彩誉 愛紅	40 30	7/19 (7/21)	8/下 (8/29)	()	()	並	不良	8月の多雨	発芽率の低い圃場が見ら れ、一部再播種された。
	夏まき	砺波市	15.5	194	愛紅 紅ひなた	85 15	7/16 ()	9/上 ()	()	()	やや遅い	不良	8月の多雨・寡日照	ほ場準備ができず、予定の面積が定植で きなかった。また播種されたほ場も十分に 乾いていないため、碎土率悪く発芽率が 低下。さらに、たびたびの集中豪雨によっ て土壌がクラスト化し、発芽率が低下。
さといも	普通	入善・朝日	4.2	84	大和	100			4/上		並	並		草丈100～130cm
	普通	上市町 (見込み)	11.5	96	大和	98			4/3 (4/5)	6/10 (6/7)	並	並		生育順調、5月上旬定植株、生 葉数4.5枚、葉令15.5枚、草丈約 120cm
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/中)	5/下 (6/9)	並	並		生育順調
	普通	小矢部 (福岡含む)	4.7	94	大和	100			4/24 (4/24)	5/下 (5/中)	並	並		草丈150cm程度、生育順調
	普通	砺波市	2.5	100	大和	95			5/4	5/下	並	並	高温多湿 薬害の可能性	草丈110cm程度。 一部、葉枯れ
	普通	南砺市 (福野)	7.3	100	石川早生 大和	30 60			4/15 4/下	6/上	並	並	多雨	早生:8/27から個別、9/4から共選。 大和は草丈130cm程度。
	普通	南砺市 (井波)	16	100	大和	90			4/下	5/下	並	並	薬害の可能性	草丈100cm程度。 一部、外葉で葉枯れ・葉折れ
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市 (目標)	200	169	ターザン もみじ3号	90 10	8/24	9/6	10中	11上		並		発芽期 播種の早いものの発芽は概ね良好
プチヴェール	冬どり	入善・朝日	0.2	100	プチヴェール	100			8/下	9/上	並	並		生育良好、草丈約20cm