

野菜生育情報(11月7日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨 年 比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	9.5	123	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/16	4/5	3/31	6/10	並	並		台風被害後の肥大回復
		富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	71	夏扇4号 夏山一本	55 24	2/10 (1/27)	4/10 (4/10)	4/20 (4/24)	6/1 (5/30)	並	やや不良	7月の高温・乾燥 8月下旬以降の多雨	収穫終盤になり太り良好
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/11 (1/17)	4月中旬 (4/2)	3/26 (3/31)	5/13 (5/16)	並	やや不良	7月の高温・乾燥 8月下旬以降の多雨	収穫始まるも太り悪い 10月中旬より本格的に出荷
		富山市 (大沢野)	3.1 (見込み)	78	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/20 (1/27)	3/25 (4/10)	4/4 (4/20)	5/20 (5/20)	並	やや不良	7月の高温・乾燥 8月下旬以降の多雨	ハモグリバエの多発による 生育停滞
		富山市 (大山)	2.2 (見込み)	88	夏扇4号 長宝	80 20	1/15 (1/23)	3/20 (4/10)	4/4 (4/1)	5/8 (5/8)	並	並		生育は概ね順調
		立山町	11.0 (見込み)	84.6	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7 (1/6)	4月下旬 (4/20)	3/28 (3/30)	6月上旬 (6/10)	並	やや不良	9/4の台風、7月の高温・乾 燥	10月から出荷量が増え始 め
		射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下 (4/5)	4/15 (4/15)	4/13 (5/1)	6/15 (6/1)	やや遅れている	不良	7月の高温・乾燥 8月下旬以降の多雨	外葉の枯れが目立つ。細い ものが多い
		氷見市	3.5	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/20 (2/25)	3/10 (3/15)	4/20 (4/14)	5/13 (4/25)	遅れている	不良	高温及び雨不足により生葉 数低下、台風による葉折れ	草丈70cm、葉鞘径10~ 15mm、生葉数3~4枚、高 温のために生葉数低下
		砺波市	6	80	関羽 森の奏	70 15	1/9 ()	()	3/28 ()	()	やや遅れ気味	やや不良	7月の少雨・乾燥	草丈70~75cm程度、生葉
		南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 10	2/3 ()	3月中 ()	4/13 ()	6/中 ()	やや遅れ気味	やや不良	7月の少雨・乾燥	草丈70cm程度、生葉数4枚
ハウス白ねぎ	春まき 冬どり (施設)	入善町、朝日町	1.6	100	ホワイトスター		5/下	6/中	6/下	並	並		概ね良好。草丈60~85cm 葉鞘径20mm以上も多い	
		富山市(婦中他)	0.12		森の奏で		4/下		6/中					スリップス散見
		富山市	0.15		ホワイトスター-龍ひかり		5/30		7月中		並	並		生育は概ね順調
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100	スーパーヴィジョン		周年			並	並		生育は概ね順調	
		高岡市	11.0	100	ハンター	80	-	-	-	-	並	並		9月下旬播きの出荷が行わ れている。露地の出荷量が 回復してきた。
こまつな	周年	魚津市	1.0	149	のりちゃん はまつぎ	40 40					並	並		生育は概ね順調
		富山市 (JAなのはな)	5.8	116	あつちゃん 一部品種試験	90 10					並	並		生育は概ね順調
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	春のセンバツ	100	(周年)				並	並		生育は概ね順調
		射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
キュウリ	抑制	富山市 (八ヶ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	60 40			8/3 (8/5)	8/19 (8/22)	並	並		生育概ね順調 一部で追肥不足により樹勢弱い
		富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	66	兼備2号	80			8/7	8/20	並	並		出荷ほぼ終了
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	0.9	70	新藍	100	7/10		8/10	8/下	やや遅い	やや不良	9月の長雨、日照不足	小玉傾向で、今週末の出荷 で当面、出荷休止
		富山市 (JAなのはな)	5 (見込み)	132	輝吉 おきな		7/11	7/30	8/6	8/27	やや遅い	並	9月の多雨、寡日照	生育遅れが目立つ 一部でアントシアニン発現
		高岡	4.4	105	おきな 輝吉	50 10	7/2 (7/5)	8/9 (8/11)	7/23 (8/1)	8/31 (8/30)	やや遅れている	やや不良	定植後の高温乾燥・9月の日 照不足	肥大不足で、契約出荷量が 確保できない。
		小矢部 (福岡舎)	17.3	111	おきな 輝吉	59 29	7/5 (7/7)	8/3 (7/31)	7/31 (7/29)	8/31 (9/1)	遅れている	不良	定植後の高温乾燥、9月の 寡日照	肥大不足で、契約出荷量が 確保できない。
		南砺市 (福光)	0.95	120	湖月SP おきな	30 60	6/27	7/23	8/1	8/中	収穫中	並	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月 上・下の台風・降雨と日照不足	10/下~収穫開始。 適宜収穫中。
		南砺市 (福野)	6.8	97	おきな 青龍345	30 15	7/10		8/3		収穫中	やや不良	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月 上・下の台風・降雨と日照不足	順次収穫中も小玉
カンカンキャベツ	夏まき 冬どり	砺波市	0.6		彩音		8/上中			並	並		生育良、結球始期	
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	8/1	8/下	8/25	9/20	やや遅い	並		秋期の長雨、日照不足によ り生育がやや遅れ、バラツ キが目立つ。
		高岡市	1.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上 (8/上)	8/下 (8/下)	9/上 (8/下)	9/中 (9/中)	並	並		中旬頃より収穫予定。生育 は順調
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう サマードーム	50 30	7/15 (7/5)	8/1 (7/15)	8/3 (7/25)	8/25 (8/25)	並	やや不良	台風による葉折れ、欠株発生 9月の多雨	順次収穫されている
		南砺市 (福光)	3.4	121	おはよう	100	7/13	7/23	8/11	8/下		やや不良	7月の高温・乾燥 8月下・9月上・下の台風・降 雨と日照不足	出荷初期は小花蕾傾向及 び黒すす病多発生していた が、現在は例年並みの大き さである。
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30	()	()	()	()	出荷量3.6t(前年比110%)	やや不良	8月下・9月上・下の台風・降	
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	15.4	109	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	9/27	-	-	遅い	やや不良	台風被害及び秋期の長雨、 日照不足	収穫までの日数が約10日 遅れている(通常60日程 度)。根の肥大もバラツキが 目立つ。
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100			8/中 (8/19)	10/上 (10/5)			並	並	8月下旬、9月の降雨	発芽ムラ、播種遅れにより 生育遅れ目立つ
大かぶ	露地 夏まき	富山市 (婦中)	9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/15 (8/14)	9/10 (9/6)			やや遅い	やや不良	8月の多雨による播種の遅れ 台風21号による葉折れ	8月中旬播種は収穫終了、 9月以降播種の収穫開始
		高岡市	6.8	100	早生大かぶ 京千舞	20 80	8/17 (8/10)	8/25 (9/25)			並	並		一部で割れや変形がみられる が、全体的には生育順調。
		南砺市 (福光)	3.2	128	早生大かぶ	100	8/26		-	-	カブの肥大が遅い	並	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月 上・下の台風・降雨と日照不足	早植えで球の直径8~10cm カブの肥大が悪い

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
にんじん	夏まき	富山市 (あおば全域)	11.6	120	愛紅	45	7/20	8/10			並	並	播種時の高温	10月中旬以降急激に肥大。現在8/3~8/4播種の根重が180~230gと収穫適期。
	夏まき	高岡市	9.0	108	彩誉 彩誉 愛紅	40 40 30	7/20 (7/22)	8/22 (8/19)			並	並		現在1.5ha程収穫が終了、一部で岐根、短根が見られる。
	夏まき	砺波市 南砺市	19	123	愛紅 紅ひなた	85 15	7/20 ()	9/上 ()	()	()			8月下・9月上・下の台風・降雨と日照不足	10/下~収穫開始。順次収穫中。
カンカン にんじん	夏まき	砺波市 南砺市	0.3 0.4		彩誉 彩誉		9上 8下		-	-	遅	やや不良	8月の多雨、10月の曇天、多雨	発芽率悪い
さといも	普通	入善・朝日	3.7	80	大和	100			4/3	5/25	やや遅い	やや不良	7月の少雨、9月の日照不足	小玉傾向のため、収穫を遅
	普通	上市町	11	96	大和	97			4/3	6月上旬	並	やや不良	7月の高温・乾燥、9/4の台風	M中心でやや小玉傾向。生葉数2枚前後/株、収穫は終盤で、11/20頃出荷終了予定。
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.9	107	大和	100			4/中 (4/15)	5/下 (5/25)	並	並		収穫はほぼ終了
	普通	小矢部 (福岡含む)	4.4	95	大和	100			4/26 (4/25)	4/27 (5/25)	並	不良	7月の高温乾燥、9月の寡日照	10月上旬より掘取りが始まっている。
	普通	砺波市	1.7	140	大和	95			4/28	5/1	収穫中	並	出芽期以降から高温乾燥	例年より2週間程、出荷開始が遅れた
	普通	南砺市 (福野)	11.7	113	石川早生 大和	30 60			4/22 5/7	5/下 6/中	収穫中	並		早生:9上に終了 大和:11中に収穫終了予定
	普通	南砺市 (井波)	11.1	86	大和	90			4/20	6/上	収穫中	並		
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	190 (目標)	161	ターザン もみじ3号	90 10	8/22	9/6	10/11	11中 予定	一部で植え付け精度が悪い	並	9月の多雨	定植終期(11/7現在残り2経営体・3ha) 一部で畝立てできず、大豆跡等にほ場変更
プチヴェール	冬どり	入善町、朝日町	0.2	100	プチヴェール	100			8/1	8/下	並	並		概ね良好。草丈55~75cm。下位の節からシュートの発生が多い。
にんにく	露地普通	南砺市 (城端)	2.2 (見込み)	95	上海早生 嘉定	90 10			9/27 ~	11/中	平年並み。植付けが早い場合は、生育がやや早い。	並	特になし	上海:草丈35~40cm、生葉数4~5枚