

野菜生育情報(8月8日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			生育状況
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	10.4	109	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/15		3/28	6/上	やや遅い	やや不良	高温乾燥	7月までは生育が旺盛だったが、梅雨明け後の高温乾燥により、現在、生育は停滞ぎみとなっている。
		富山市 ハケ山	1.5 (見込み)	71	夏扇4号 夏山一本	55 24	2/10	(1/27) (4/10)	4/20	6/1	並	並		
	中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/11	4月中旬 (1/17) (4/2)	3/26	5/13	並	並			
	富山市 (大沢野)	3.1 (見込み)	78	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/20	3/25 (1/27) (4/10)	4/4	5/20	並	並			
	富山市 (大山)	2.2 (見込み)	88	夏扇4号 長宝	80 20	1/15	3/20 (1/23) (4/10)	4/4	5/8	並	並			
	立山町	11.0 (見込み)	84.6	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7	4月下旬 (1/6) (4/20)	3/28	6月上旬	並	並			
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー ホワイトスター	30 20	1下	3下 (2/5) (3/25)	4上	4/25	並	並		
		氷見市	3.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上	3/中 (1/5) (2/5)	3/10	4/10	昨年より、14 日程早い	並		
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下	(4/5) (4/15)	4/13	6/15	やや遅い	並		
		氷見市	3.5	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/20	3/10 (2/25) (3/15)	4/20	5/13	遅い	やや不良	高温及び雨不足により、 生葉数低下、生育停滞	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	6	80	関羽 森の奏	70 15	1/9	() ()	3/28	() ()	やや遅い	並	高温乾燥	
		南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 10	2/3	3月中 () ()	4/13	6/中	遅い	並	高温乾燥	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	黒部市	1.6	106	越中なつ小峠 越中ふゆ小峠	40 60	1/15		3/28	5/中	やや遅い	やや不良	高温乾燥	高温乾燥により生育停滞
		魚津市	1.1	100	越中なつ小峠 越中ふゆ小峠	30 70	1/9	3/下	4/1	4/21	並	やや不良	高温乾燥、一部病害の発生	
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年				並	並		
		高岡市	11.0	100	ミラージュ	80	-	-	-	-	並	不良	高温	高温により生育が停滞し 出荷不能となるハウスあり。
こまつな	周年	魚津市	0.3	75	なつき 浜ちゃん	70 30	周年				やや遅い	並	高温乾燥	高温乾燥により生育遅れ
		富山市 (JAなのはな)	5.8	116	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育は概ね良好
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	春のセンバツ	100	(周年)				並	並		生育は概ね順調
		射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	やや遅い	並	高温	高温により生育が緩慢
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	30.6	124%	たんくろう	100	3/31	7/22	-	-	並	並		順次収穫。 排水不良により生育不良 ほ場あり。
きゅうり	抑制	入善・朝日	0.6	100	MTフェニックス 新聖	30 30	7/5		7/18	8/上	並	並		苗の軟弱徒長 花飛びが見られる。
		富山市 (ハケ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	60 40			8/3	(8/5) (8/22)	並	並		8/3から本格的に定植始まる。 一部で定植直後の高温による葉焼け見られる。
		富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	66	兼備2号	80			8/7	8/20	並	並		定植開始。 苗の生育は順調。
なす	露地	上市町	0.3	100				購入苗	4/27	5/7	並	並		土壌病害株もなく、概ね 順調に生育している。
		高岡市	0.5	100	千両2号 水なす	70 30	(1/15)	(1/25)	4/25	(5/5)	並	やや不良	乾燥	乾燥により収量が減少し ている。
すいか	トンネル早熟	入善町	3.8	86	入善ジャンボ	100	4/3	4/5	4/23	5/7	並	並		収穫終盤 2番果収穫7/30~
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	0.9	70	新藍	100	7/10		8/10		並	やや不良	育苗期の高温(7月)	苗の生育不揃い
		富山市 (JAなのはな)	5 (見込み)	132	輝吉 おきな		7/11	7/30	8/6		並		育苗期の高温(7月)	8/6から定植開始 一部で発芽不良により播き直し
		高岡	4.4	105	おきな 輝吉	50 10	7/2	(7/5) (8/11)	7/23	(8/1) (8/30)	並	並		7/23から定植開始。 一部で枯れ上がりが見られ、 植え直し実施。
		小矢部 (福岡舎)	17.3	111	おきな 輝吉	59 29	7/5	8/3 (7/7) (7/31)	7/31	(7/29) (9/1)	並	並		育苗は概ね順調。順次 定植中(7/31~)。一部で 枯れ上がりが見られる。
		南砺市 (福光)	0.95	120	湖月SP おきな	30 60	6/27	7/23	8/1	8/中	並	並		本葉5枚、生育順調 うね間灌水実施したが、 一部枯れ上がりが見られ
		(福野)	6.8	97	おきな 青龍345	30 15	7/10		8/3		並			定植前後のうね間灌水を 実施するも一部枯れ上 がる。

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう サマードーム	50 30	7/15 (7/5)	8/1 (7/15)	(7/25)	(8/25)	並	並		育苗中、本葉2枚
		南砺市 (福光)	2.8	70	おはよう	100	7/13	7/23	8/11	8/下	並	並		本葉2.5枚
だいこん	トンネル	魚津市	15.0 (見込)	115	夏の翼 秋の翼	40 30	8/1	-	-	並		高温乾燥	高温乾燥により、一部で 発芽不揃い	
にんじん	春まき	富山市 (あおば全域)	8.8 (見込み)	120	彩誉 愛紅	50 40	7/20 (7/22)	(8/19)			並	並		7月播種のほ場で発芽 率が50%以下のほ場が1 ha程度ある。
		高岡市	9.0	108	彩誉 愛紅	40 30	7/20 (7/19)	(8/28)			並	並		7月20日播きで本葉1.5枚 程度、発芽率はほ場によ りばらつきがある。
		砺波市 南砺市	19	123	愛紅 紅ひなた	85 15	7/20 () ()	() ()			一部播種遅れ		高温乾燥	かん水徹底ほ場では、発 芽順調。一部発芽不良 発生
さといも	普通	入善・朝日	3.7	80	大和	100			4/3	5/25	並	並		かん水を徹底しているほ 場は生育は概ね順調で、 葉柄長が1m程度となっ ている。 一部で、乾燥により葉柄 長が短く、生葉数が少な くなっているほ場あり。
		上市町	11.0 (見込み)	96	大和	97			4/3 (4/3)	6月上旬 (6/6)	並	並		
		高岡市 (福岡除く)	8.9	107	大和	100			4/中 (4/15)	(5/25)	並	並		
		小矢部 (福岡含む)	4.4	95	大和	100			4/26 (4/25)	4/27 (5/25)	並	並		
		砺波市	1.7	140	大和	95			4/28	5/1	やや早い	並	高温	
		南砺市 (福野)	11.7	113	石川早生 大和	30 60			4/22 5/7	5/下 6/中	並	並		
		南砺市 (井波)	11.1	86	大和	90			4/20	6/上	やや遅い	並	定植の遅れ・出芽期から 高温乾燥	