

野菜生育情報(9月10日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要						
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況			
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	10.4	109	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/15		3/28	6/上	やや遅い	やや不良	高温乾燥、台風21号	「夏扇4号」に葉先枯れ見られる。			
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 ハケ山	1.5 (見込み)	71	夏扇4号	55	2/10		4/20	6/1	並	並		葉先枯れ少発生 軟白長28cmあり			
		中央	6.2 (見込み)	100	夏山一本 夏扇4号 夏扇パワー	24 70 20	(1/27)	(4/10)	(4/24)	(5/30)	並	並		4月下旬定植:草丈80cm、 生葉数4-5枚			
		富山市 (大沢野)	3.1 (見込み)	78	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/20	3/25	4/4	5/20	並	並		ハモグリバエの多発による 生育停滞			
		富山市 (大山)	2.2 (見込み)	88	夏扇4号 長宝	80 20	1/15	3/20	4/4	5/8	並	並		生育は概ね順調			
		立山町	11.0 (見込み)	84.6	夏扇パワー	15	1/7	4月下旬	3/28	6月上旬	並	やや不良	9/4の台風、7月の高温・乾燥	9/4の台風により、しわ、曲 がり、葉の折れ等が発生。 B品の増加、日量の減少、 軟腐病の多発が懸念される。			
					夏扇4号	70	(1/6)	(4/20)	(3/30)	(6/10)							
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー ホワイトスター	30 20	1下	3下	4上	4/25	並	やや不良	台風21号による葉折れ等	草丈85~90cm、葉鞘径17 ~20mm、生葉数6枚			
		氷見市	3.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上	3/中	3/10	4/10	昨年より、 14日ほど早 い	やや不良	台風21号による葉折れ等	草丈90cm、葉鞘径20~25mm、 生葉数5~6枚、土寄せ3~4 回実施			
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下	(4/5)	4/13	6/15	やや遅い	並		草丈70cm、葉鞘径15mm、生 葉数6枚 葉色が緑色に回 復傾向			
		氷見市	3.5	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/20	3/10	4/20	5/13	遅い	やや不良	高温及び雨不足により生葉 数低下、台風による葉折れ	草丈70cm、葉鞘径10~ 15mm、生葉数3~4枚、高 温のために生葉数低下			
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	6	80	関羽	70	1/9		3/28		やや遅い	やや不良	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月上旬の台風・降 雨	収穫開始も1本重軽い			
南砺市 (城端)		1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 10	2/3	3/中	4/13	6/中	やや遅い	やや不良	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月上旬の台風・降 雨	草丈90cm程度、生葉数5枚 程度				
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.6	106	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15		3/28	5/中	並	並		9月どりほぼ終了			
	春まき 夏秋どり	魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	30 70	1/9	3/下	4/1	4/21	並	並		出荷ほぼ終了			
ハウスねぎ	冬どり	入善・朝日	1.6	100	ホワイトスター	100	5/下	6/中	6/下		並	並	概ね良好	生育順調 一部で萎凋病・根腐れ疫病による欠株			
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100						周年	並	並	8月の高温	8/7播種し直し 発芽ムラあり			
	周年	高岡市	11.0	100	ミラージュ	80	-	-	-	-	並	やや不良	台風による葉折れ、葉のしお れ	露地では茎葉折損等が見 られる。施設は8月播きの 中旬以降出荷が始まる。			
こまつな	周年	魚津市	0.3	75	なつき 浜ちゃん	70 30	周年				並	並		生育は概ね順調			
	周年	富山市 (JAなのはな)	5.8	116	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育は概ね順調			
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	春のセンバツ	100	(周年)				並	並		生育は概ね順調			
	周年	射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調 1農家で大雨による冠水被害発生			
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	30.6	124%	たんくろう	100	3/31	7/22	-	-	並	並		出荷終盤、7月中旬以降の は種のえだまめは草丈小さ く、莢数も少ない			
きゅうり	抑制	朝日・入善	0.6	100	MTフェニックス 新聖	30 30	7/5		7/18	8/上	並	並		子づる収穫中。生育良好			
	抑制	富山市 (ハケ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	60 40			8/3	8/19	並	並	8月初旬の高温	主枝の収穫開始 生育は概ね順調			
	抑制	富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	66	兼備2号	80			8/7	8/20	並	並	定植時の高温	主枝の収穫開始 生育は概ね順調			
なす	露地	上市町	0.3	100							購入苗	4/27	5/7	並	不良	9/4の台風	枝折れ、株の倒伏、落葉、新葉・ 蕾の損傷により当分の間 出荷が難しい
	露地	高岡市	0.5	100	千両2号 水なす	70 30	(1/15)	(1/25)	4/下	5/上	並	やや不良	台風による茎葉折損、しお れ	葉の破れやしおれが見ら れる。			
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	0.9	70	新藍	100	7/10		8/10	8/下	並	並		生育の早いものは芯葉が 立ち上がりつつある。			
	夏まき 秋冬どり	富山市 (JAなのはな)	5 (見込み)	132	輝吉 おきな		7/11	7/30	8/6		並	並	8月下旬以降の降雨	生育は概ね順調。 降雨により定植進まず。			
	夏まき 秋冬どり	高岡市	4.4	105	おきな 輝吉	50 10	7/2	8/9	7/23	8/31	並	並		定植1月後で外葉30cm以 上と順調であるが、一部外 葉の小さいほ場が見られ る。			
	夏まき 秋冬どり	小矢部 (福岡舎)	17.3	111	おきな 輝吉	59 29	7/5	8/3	7/31	8/31	並	並		一部で強風による葉のちぎ れ、大雨による湿害が見ら れる。			
		南砺市 (福光)	0.95	120	湖月SP おきな	30 60	6/27	7/23	8/1	8/中	やや遅い	やや不良	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月上旬の台風・降 雨	結球始期			
		(福野)	6.8	97	おきな 青龍345	30 15	7/10		8/3			やや不良	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月上旬の台風・降 雨	8/上定植で高温乾燥により 枯れが見られた			
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0 (見込)	100	黄苑80 黄福65	50 30	8/1	8/下	8/25		並	並		台風21号の強風による葉 傷み目立つ			
	夏まき 秋冬どり	高岡市	1.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上	8/下	9/上	(8/下)	並	並		定植後の生育は順調			

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等を与える要因	生育状況
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう サマードーム	50 30	7/15 (7/5)	8/1 (7/15)	8/3 (7/25)	8/25 (8/25)	並	やや不良	台風による葉折れ、欠株発生	葉数7~10枚
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	3.4	121	おはよう	100	7/13	7/23	8/11	8/下		並		早植えは生葉数10~12枚 遅植えは草丈23cm、生葉 数6~7枚
だいこん	夏まき	魚津市	15.0 (見込)	115	夏の翼	40	8/1		-	-	並	並		一部ほ場で台風21号の強 風による葉傷み、莖葉折損 が目立つ
	秋冬どり				秋の翼	30								
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100			(8/19)	(10/5)			並	並	8月下旬以降の降雨	8月中旬以降から は種開始
大かぶ	露地 夏まき	高岡市	6.8	100	早生大かぶ	20	8/17	8/25			並	並		8月17日までに草丈7~15 cm、葉数5枚、生育にバラ つきがある。
	露地 夏まき	南砺市 (福光)	2.7	108	京千舞	80	(8/10)	(9/25)			並	並		葉数2.5枚 発芽は概ね順調
にんじん	夏まき	富山市 (あおば全域)	11.6	120	愛紅	45	7/20	8/10			並	並	播種時の高温	7月は種のほ場で発芽率 50%未満のほ場が1ha程度 あり、7~8月播種の平均 発芽率は58%と低い。
	夏まき	高岡市	9.0	108	彩誉 彩誉 愛紅	40 40 30	7/20 (7/19)	8/22 (8/28)			並	並		7月20日までに本葉6枚程 度、発芽率はほ場によりば らつきがある。
	夏まき	砺波市 南砺市	19	123	愛紅 紅ひなた	85 15	7/20 () ()	9/上 () ()			やや遅い	やや不良	7月の少雨・乾燥 →8月下・9月上の台風・降 雨	一部発芽不良によりまき直 し実施。
さといも	普通	入善・朝日	3.7	80	大和	100			4/3	5/25	並	並		草丈75~110cm。台風21号 の強風により葉身の破れ
	普通	上市町	11	96	大和	97			4/3	6月上旬 (4/3) (6/6)	並	やや不良	7月の高温・乾燥、9/4の台 風	9/4の台風により、2枚以上 /株の葉の損傷、9/7の試し 掘り等では昨年より、草丈、 芋数、芋重が少ない。
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.9	107	大和	100			4/中 (4/15)	(5/25)	並	並		草丈100~120cm、台風の 影響で葉の損傷が見られ
	普通	小矢部 (福岡含む)	4.4	95	大和	100			4/26 (4/25)	4/27 (5/25)	並	並		草丈90~100cm。台風の影 響で葉の損傷が見られる。
	普通	砺波市	1.7	140	大和	95			4/28	4/3221	平年並み	並	出芽期以降から高温乾燥	葉柄長130~140cm程度。 豪雨・台風により一部、葉折れ
	普通	南砺市 (福野)	11.7	113	石川早生 大和	30 60			4/22 5/7	5/下 6/中	遅れ気味(早 生の出荷開 始前年より1 週間遅い)	並	高温乾燥	早生9/1から個選、9/9から共選開始 大和は葉柄長110~120cm程度。
	普通	南砺市 (井波)	11.1	86	大和	90			4/20	6/上	やや遅い	並	定植の遅れ・出芽期から高 温乾燥	ほ場間で差が見られ、生葉 数 4~5枚程度、葉柄長約80 ~110cm。
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	197	103	ターザン もみじ3号	90 10	8/22	9/6	10中	11上		並	8下の高温と9上の日照不 足	発芽期 は種が早いものの発芽は 概ね良好、やや徒長気味
プチヴェール	冬どり	入善・朝日	0.2	100	プチヴェール	100			8/上	8/下	並	並	高温	高温による植遅れで生育が 遅れているほ場もある。