

平成30年度 とやまのカン(寒)・カン(甘)野菜の生育状況(平成31年2月6日現在)

| 品目名 | 施設 | 市町村 | 品種名 | 作付面積 a | 播種日 | | 定植日 | | 生育概要 |
|--------------------|----|----------|------------------|-----------|-------|-------|------|------|--|
| | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 病害虫発生状況 |
| 寒締め ほうれんそう | | 富山市 | スーパーヴィジョン 弁天丸 | 11.5 | 10/10 | 11/1 | | | 生育は概ね順調。10月中旬播種は収穫終了。10月下旬播種で草丈35cm。Brix糖度は8.5~12.5% |
| | | 高岡市 | スーパーヴィジョン 弁天丸 | 39.5 | 10/5 | 11/4 | | | 生育は概ね順調。1/4から出荷。 |
| | | 氷見市 | スーパーヴィジョン 弁天丸 | 9 | 9/20 | 10/16 | | | 1/10から出荷。播種の遅いものの草丈は20~30cm 一部で、湿害による生育不良あり。 |
| | | 砺波市 | スーパーヴィジョン 弁天丸 | 14.1 | 10/上 | 10/12 | | | 1月上旬より出荷。一部ほ場で、糖度上昇前に、草丈が出荷規格に達したものあり。 |
| | | 南砺市 | | 6 | 10/中 | 10/中 | | | |
| 寒締め こまつな | | 砺波市 | 冬里 | 9.6 | 11/上 | | - | - | 1月下旬から出荷。 |
| | | 南砺市 | | 4 | 11/上 | | - | - | |
| ハウスねぎ | 施設 | 入善町・朝日町 | ホワイトスター | 160 | 5/下 | 6/中 | 6/下 | | 収穫終期 |
| | | 富山市(婦中他) | 森の奏で、龍ひかり1号 | 5 | 4/下 | | 6/中 | | 2月上旬から出荷。一部で、塩類集積による生育抑制あり。 |
| | | 富山市 | ホワイトスター・龍ひかり1号 | 15 | 5/30 | | 7/中 | | 12月29日から収穫。収穫作業進む |
| | | 高岡市 | ホワイトスター・龍ひかり1号 | 25 | 5/上 | 5/中 | 6/中 | 6/下 | 生育順調。1/11から出荷開始。 |
| なばな | | 富山市 | 冬華 | 4.4 | 9/中 | | 10/下 | 11/3 | 生育概ね順調。一部定植遅れで収穫量ピークが遅れている。 |
| | | 砺波市、南砺市 | 冬華、オータムポエム | 18.5 | 9/上 | | 10/中 | | 生育順調。南砺市は12月中旬、砺波市は1月上旬から出荷。 |
| プチヴェール | | 入善町・朝日町 | プチヴェール | 20 | - | | 8/1 | 8/下 | 収穫終期。一部で菌核病発生。 |
| いちご | | 射水市 | かおり野 | 5 | | | 10/上 | | 暖房の設定温度低く、生育がやや停滞し、収穫量が少ない。 |
| アスパラガス (伏せ込み栽培) | | 砺波市 | ウインデル | 1.9 | 1/31 | | 4/20 | 5/8 | 12月下旬から収穫。S・2Sが多く、収穫打ち切りが早い予想。 |
| | | 南砺市 | ウインデル | 1.2 | 1/21 | | 4/1 | | 12月下旬から収穫。L・M中心の収穫。 |
| カンカン にんじん | 露地 | 高岡市 | 彩誉、愛紅 | 60 | 8/28 | | - | - | 収穫開始が遅れ、2月上旬から出荷開始。 |
| | | 砺波市 | 彩誉他 | 60 | 8/25 | 9/上 | - | - | 1月下旬から出荷。 |
| | | 南砺市 | 彩誉 | 40 | 8/下 | 9/上 | - | - | 12月中旬から出荷。 |
| カンカン キャベツ | | 高岡市 | 夢ごろも | 80 | 7/下 | | 8/17 | 8/18 | 生育概ね順調。1月7日より出荷。 |
| | | 砺波市 | 彩音 | 55 | 8/上 | 8/中 | 8/下 | | 生育順調。1月20日から出荷。 |