

## 野菜生育情報(5月8日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	(3.2)	(100)	(吉晴) (春川)	(60) (40)	4/25 (4/25)	5/15 (5/15)	6/15 (6/15)	6/25 (6/25)	やや早い	並		春川で抽苔が多発生。吉晴は抽苔前 出荷は昨年より早回る見込み。
		氷見市	1.1	270	吉晴 羽根緑一本太	60 40	3/15 (4/20)	4/25 (5/20)	6/5 (6/10)	6/20 (7/15)	昨年より、10 日ほど早い。	やや不良	昨年7~8月の高温 干ばつによる欠株	抽苔が散見。
	坊主不知	氷見市	0.1	10	清心	100			9/10 (9/5)	9/15 (9/15)	並	並		
	秋まき 初夏どり	氷見市	0.4	50	羽根緑一本太	100	9/10 (9/10)	9/15 (9/20)	10/25 (10/20)	11/4 (11/10)	並	並		
	春まき 秋冬どり	黒部市	12.4 (見込み)	119	夏扇4号 夏山一本太	52 32	1/21	5/上	3/20	6/中	並	並		4月上旬定植で草丈21cm、 生葉数2.6枚、太さ6mm程度
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	125	夏扇4号 夏山一本	55 24	2月上中旬 (2/10)	(4/10)	4/21 (4/20)	(5/30)	並	並		順次定植作業が進む。 定植後の生育は順調
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/15 (1/17)	4月中旬 (4/2)	3/26 (3/31)	(5/16)	並	並		夏秋どりの定植順次進む。
		富山市 (大沢野)	3.0	85	夏扇4号 夏扇パワー	40 30	1/31 (1/27)	4/16 (4/10)	4/5 (4/20)	5月下旬 (5/20)	並			順次定植作業が進む。 定植後の生育は順調
		富山市 (大山)	2.0	90	夏扇4号 長宝	80 20	2/15 (1/23)	3/20 (4/10)	4/5 (4/1)	(5/8)	並			生育順調
	春まき 夏秋どり	立山町	11.0 (見込み)	100	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7 (1/6)	(4/20)	3/28 (3/30)	(6/10)	並			順次定植作業が進む。 定植後の生育は順調
		射水市	(9.0)	(100)	(夏扇パワー (源翠)	30 20	1/10 (1/25)	3/20 (3/25)	3/20 (4/5)	(4/25)	並	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	氷見市	3.0	100	ホワイトソード 龍美	30 30	1/4 (1/5)	1/18 (2/5)	3/10 (3/15)	4/10 (4/5)	並	並		定植後、4月上旬までは低温で 生育が停滞、その後は順調
		射水市	4.0	100	関羽一本太 ホワイトソード	30 30	3/20 (3/25)	(4/15)	(4/13)	(6/15)	並	並		順次定植作業が進む。 定植後の生育は順調
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	氷見市	4.0	100	関羽一本太 ホワイトソード	30 30	2/1 (2/20)	3/25 (3/10)	(4/20)	(5/13)	並	並		育苗順調で、定植作業中
		砺波市	6(見込み)	100	関羽 夏扇パワー	70 15	1/9 ( ) ( )	( ) ( )	3/27 ( ) ( )	( ) ( )	昨年並みの 生育	並		生育順調、生葉2.0~2.5 枚、草丈20~25cm
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	南砺市 (城端)	1.2(見込 み)	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	2/5 ( ) ( )	3/15 ( ) ( )	4/10 ( ) ( )	5/上 ( ) ( )	昨年並みの 生育	並		生育順調、生葉2.0~2.5 枚、草丈20~25cm
		黒部市	1.6 (見込 み)	106	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15		3/28	5/中	並	並		約50%定植終了 3月植えの生育良好
ほうれんそう	周年	魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	30 70	1/9	3/下	4/1	4/21	並	並		生育順調
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100					周年					播種は5月中旬以降
こまつな	周年	高岡市	11.0	100	晩抽サンホープ ジャスティス	40 30	-	-	-	-	並	並		露地栽培では4日の強風 の影響で葉傷みが見られ る。施設栽培は生育順調、 4月上旬播きを収穫中。
		魚津市	0.4 (見込 み)	100	浜ちゃん なつき	50 50					並	並		生育順調
		富山市 (JAなのはな)	5.8	100	春のセンハツ	100					並	並		生育順調
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(春まき)春のセンハツ (春まき)夏楽天	60 30					並	並		生育順調
えだまめ	周年	射水市	(2.0)	(100)	(冬里)	(40)	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
		射水市	36.8 (見込み)	120%	たんくろう	100	4/5 (3/31)	7下 (7/22)	-	-	並	並		4月上旬は種で本葉1枚展開 中。トンネルマルチ栽培では本 葉2枚展開中
トマト	半促成	富山市 (富山)	1.8	100	桃太郎ワンダー その他	70 30	1/7 (1/7)	1/30 (1/30)	3/19 (3/20)	4/10 (4/1)	早	並	クロマルハナバチの活動低下 4月下旬の高温	早い株で5段果房開花始 期 3、4段目の落花、ガク枯れ 目立つ
		魚津市	0.5	100	アニモTY-12		1/上		3/中	3/下	並	並		4~5段果房開花中
		南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	60 30	苗購入 ( ) ( )	( ) ( )	2/18 ( ) ( )	3/中 ( ) ( )	昨年並みの 生育	並	平年並みの気温 (一昨年同時期6~7段目開花)	7~8段果房開花中(前年同等)
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.8	100	新聖 兼備2号	50 45	1/22 購入苗一部あり		2/25	4/10	やや遅い	並	4月の低温により収 穫開始がやや遅れ た。	生育順調 定植早いものは主枝の収穫終盤
なす	露地	上市	0.3	100			購入苗		4/26 (4/27)	5月中旬 (5/7)	並	並	定植作業やや遅い	活着良好
		高岡市	0.3	100	千両 千両2号	70 30	3/上 (1/15)	(1/25)	5/6 (4/25)	(5/5)	並	並		は種が遅れたが、苗の生 育は順調

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
すいか	トンネル早熟	入善町	4.2 (見込)	108	入善ジャンボ	100	4/3	4/中	4/23		並	並		4月植えで4~5葉
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	(2.7)	(100)	(極早生732号) (春ひかり7号)	(50) (30)	9/25 (9/25)	10/5 (10/5)	10/25 (10/25)	11/20 (11/25)	やや早い	不良		出荷期は昨年より早い
加工用キャベツ	春まき 夏どり	小矢部市 (福岡含む)	8.0	125	おきな 初恋	60 40	3/1 (3/12)	3/16 (3/30)	4/6 (4/10)	4/20 (4/20)	並	並		本葉10枚程度展開。生育順調。
		南砺市 (福野)	2	100	おきな 初恋	60 20	2/20 ( )	4/5 ( )	4/中 ( )	( )	( )	並	平年並みの気温	4/中~5/上に定植。4/中定植で葉数12枚程度、葉長10~15cm程度
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30	( )	( )	( )	( )	並	並	4月下旬の強風により露地栽培で曲がり多発生	現在収穫中。ハウス栽培は細茎や曲がりが多く、春どり終盤
だいこん	春まき	魚津市	3.0 (見込)	100	晩々G 晩抽春のいぶき	40 40	3/30		-	-	並	並		生育順調 最大葉長5~6cm、葉数4枚
	トンネル	富山市 (なのはな)	0.3	100	天宝	100	3/28 (3/25)	3/31 (3/31)			並	並		概ね生育順調 本葉15枚程度
	トンネル マルチ	氷見市	0.9	100	晩抽春のいぶき 天宝	50 30	2/25 (2/27)	3/14 (3/14)	( )	( )	並	並		生育順調、本葉10~20枚 展開中、根径30~40mm
にんじん	春まき	富山市 (あおば全域)	0.2	100	彩誉	70	3/8 (3/13)	3/15 (4/10)	( )	( )	並	並		3/8播種5葉期 3/15播種3.5葉期
		高岡市	0.6	300	紅うらら	100	3/25 (4/20)	3/26	-	-	( )	( )		本葉2~2.5枚展開 苗立率:不織布被覆87%、無被覆69%
		砺波市	0.2	前年 無	紅うらら	100	3/20 ( )	3/20 ( )			早	並	不織布のべたがけによる生育促進	不織布のべたがけほ場で生葉2.5~3.5枚、葉長10cm程度、べたがけ無ほ場は生葉2.0枚で葉長5cm程度
たまねぎ	露地普通	砺波市	190	99	ターサン	90	8/22	9/6	10/11	11/11	生育は例年に比べ、早回っている。	並 ~やや良	定植前の事前排水対策の徹底と暖冬	葉折れ部からのバクテリア侵入による腐敗が散見される。一部で抽苔を確認
		南砺市			もみじ3号	10	( )	( )	( )	( )				
にんにく	普通	南砺市 (城端)	2.3	100	上海早生 嘉定	87 13	( )	( )	( )	( )	生育は非常に進んでいる	やや良	種球更新、連作回避	植付早期化、暖冬による積雪期間短縮により、出葉数16~18枚(前年13枚)と生育旺盛
さといも	普通	入善・朝日 (見込み)	4.0	100	大和	100			4/10					萌芽前
		上市町 (見込み)	10.0	100	大和	97			4/3 (4/3)	6月上旬 (6/6)	並			4月初旬植付ほ場は萌芽間近、植付は順調に進む。
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/9 (4/15)	(5/25)	並	並		萌芽はまだ見られない。
		小矢部 (福岡含む)	3.8	86	大和	100			4/20 (4/26)	4/22 (4/27)	並	並		萌芽はまだ見られない。
		砺波市	2.7	158	大和	95			5/5			並		植付は順調に進む。
		南砺市 (福野)	12 (見込み)	102	石川早生 大和	30 60			4/24 5/5	5/下 6/上		並		石川早生は4下~5上で植付進む。 大和は5月上旬で植付進む。
		南砺市 (井波)	10.5 (見込み)	94	大和	90			5/4	6/上		並		植付は順調に進む。
ばれいしょ	春植え	魚津市	0.3	100	男爵	80			3/25		並	並		萌芽順調、草丈10cm程度
		富山市 (なのはな、富山)	5.3	106	男爵 とうや	53 47			3/20 (3/25)	4/6 (4/10)	並	並		概ね生育順調。 培土実施中。
		射水市	0.8	80%	とうや	100			3/26 (3/28)	3/27 (3/29)	並	やや不良		萌芽揃い期 萌芽率がやや低い
		高岡市	4.8	145%	男爵 ニシユタカ	38 38			3/20 (3/25)	3/27 (4/4)	並	並		萌芽揃い 草丈18cm葉数7枚