

野菜生育情報(6月11日現在)

※()の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	(3.2)		(吉晴) (春川)	(60) (40)	4/25	5/15	6/15	6/25	やや早い	並			
		氷見市	1.1	270	吉晴 羽根緑一本太	60	3/15	4/25	6/5	6/20	昨年より、10 日ほど早い。	やや不良	昨年7~8月の高温干 ばつによる欠株と今年 5月以降の抽たい	5月中旬以降から抽たいが 多発	
	坊主不知	氷見市	0.1	10	清心	100			9/10	9/15	並	並			
	秋まき 初夏どり	氷見市	0.4	50	羽根緑一本太	100	9/10	9/15	10/25	11/4	やや早い	並		抽たいが散見	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	黒部市	12.4	119	夏扇4号 夏山一本太	52 32	1/21	5/上	3/20	6/中 残り 60a	並	並		4月上旬定植で草丈47cm 程度生葉数4.5枚程度、太 さ14mm程度	
		富山市 八ヶ山	1.5	125	夏扇4号 夏山一本	55 24	2/上中	(2/10)	4/21	(4/20)	並	並	高温乾燥	生育は概ね良好	
		中央	6.2	100	夏扇4号	70	1/15	4/中	3/26	5/25	並	並	高温乾燥	夏秋どり定植完了 生育は概ね良好	
			(見込み)		夏扇パワー	20	(1/17)	(4/2)	(3/31)	(5/16)					
		富山市 (大沢野)	3.0	85	夏扇4号 夏扇パワー	40 30	1/31	4/16	4/5	5/31	並	並	高温乾燥	生育停滞気味	
		富山市 (大山)	2.0	90	夏扇4号 長宝	80 20	2/15	3/20	4/5	(4/1)	(5/8)	並	並	高温乾燥	生育停滞気味
		立山町	11.0	100	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7	(1/6)	(4/20)	3/28	(3/30)	並	並	高温乾燥により、 やや出葉遅れ	生育は概ね良好
	春まき 夏秋どり	射水市	(9.0)		(夏扇パワ (源翠)	30 20	1/10	3/20	3/20	(4/5)	並	並		生育順調	
		氷見市	3.0	100	ホワイトソード 龍美	30 30	1/4	1/18	3/10	4/10	並	並		草丈40~50cm、葉鞘径12 ~15mm、生葉数5~6枚、 土寄せ2回程度実施	
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 ホワイトソード	30 30	3/20	(3/25)	(4/15)	(4/13)	(6/15)	並	並		
		氷見市	4.0	100	関羽一本太 ホワイトソード	30 30	2/1	3/25	(2/20)	(3/10)	(4/20)	(5/13)	並	並	草丈25~30cm、葉鞘径 5mm、生葉数4枚、土寄せ 1回程度、5月下旬以降の 高温雨不足で生育停滞傾 向
春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	5.3	100	関羽	70	1/9	(-)	(-)	3/27	6/6	平年並み	並	定植の早いもので草丈40c m、生葉数3.5~4.0枚程度		
	南砺市 (城端)	1.2	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	2/5	3/15	4/10	5/25	平年並み	並	並	定植の早いもの草丈35c m、生葉数3.5枚		
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	黒部市	1.6	100	越中なつ小町	50	1/16	3/13	3/22	5/中	並	並		3月下旬定植で草丈53cm 程度生葉数4.5枚程度、太 さ16mm程度	
		魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	30 70	1/10	1/24	3/25	4/18	並	並		生育順調、なつ小町70c m、ふゆ小町60cm程度	
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3	100			周年							順次播種され、概ね順調	
		高岡市	11.0	100	晩抽サンホープ ジャスティス	40 30	-	-	-	-	並	並		露地栽培、施設栽培は生 育順調、	
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	なつき のりちゃん	50 50	周年		-	-	並	並		生育は順調 一部で高温による葉先枯 れがみられた。	
		富山市 (JAなのはな)	5.8	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育は概ね順調	
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(春まき)春のセンバツ (春まき)夏楽天	60 30	(周年)				並	並		生育は概ね順調	
		射水市	(2.0)		夏音 夏の甲子園	(40) (30)	周年	周年	-	-	並	並		生育順調	
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	36.8 (見込み)	120	たんくろう	100	4/5	7下 (3/31)	(7/22)	-	-	やや早い	並	4月上旬は種のべたがけ栽 培では6月上旬に開花期を 迎えた。トンネルマルチ栽 培では高温により、生育抑 制および枯死株が発生。不 織布を被覆していない場合 で、鳥害の発生がみられ る。生育はおおむね順調。	
トマト	半促成	富山市 (富山)	1.8	100	桃太郎ワンダー その他	70 30	1/7	1/30	3/19	4/10	早	並	高温により5、6段目 の結実不良目立 つ。	2、3段目収穫中。5/30を中 心に7、8段目で摘芯。球肥 大良好。	
		魚津市	0.5	100	アニモTY-12	100	1/上		3/中	3/下	並	並		8段開花、3~4段目収穫 中	
		南砺市	0.4	100	OF桃太郎ファイ OFハウス桃太郎	60 30	苗購入 (-)	(-)	2/18	3/中 (-)	平年並み(例年 10~11段目ま で着果)	並~やや不良	5月25~27日の高 温により、以降の果 実が小玉傾向	11段目着果 摘芯 6段収穫中	
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.8	100	新聖 兼備2号	50 45	1/22		2/25	4/10	並	並		生育良好。子づる出荷盛 期。	

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
なす	露地	上市	0.3	100			購入苗		4/26 (4/27)	5/6 (5/7)	並	並		概ね生育順調 下葉、脇芽の整理中
		高岡市	0.3	100	千両 千両2号	70 30	3/上 (1/15)	3/16 (1/25)	4/25 (4/25)	5/6 (5/5)	並	並		
すいか	トンネル早熟	入善町	4.2 (見込み)	108	入善ジャンボ	100	4/3	4/中	4/23		並	並		つる長は250cm以上となっ ており、2番花交配中。
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	(2.7)		(極早生732号) (春ひかり7号)	(50) (30)	9/25 (9/25)	10/5 (10/5)	10/25 (10/25)	11/20 (11/25)	やや早い	不良	細菌性病害の多発	出荷期は昨年より早い
加工用キャベツ	春まき 初夏どり	小矢部市 (福岡含 む)	8.0	125	おきな 初恋	60 40	3/1 (3/12)	3/16 (3/30)	4/6 (4/10)	4/20 (4/20)	並	並		初恋で球径10~15cm、お きなで10cm前後
		南砺市 (福野)	2	100	おきな 初恋	60 20	2/20 (-)	4/5 (-)	4/中 (-)	4/20 (-)		並	平年並みの気温	4中~5上にかけて定植さ れた。4月中旬定植のも ので葉数12枚程度、葉長10 ~15cm程度。
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30						並		細いもの多くなり、多くの圃 場で収穫打ち切りされてい る 6月10日で春どり出荷終了 (昨年6月2日)
だいこん	トンネル	魚津市	3.0	100	晩々G 晩抽春のいぶき	40 40	3/30				並	並		生育順調 抽苔なし
	トンネル	富山市 (なのほな)	0.3	100	天寶	100	3/28 (3/25)	3/31 (3/31)			並	並		播種期にトンネル未被覆の ほ場で抽苔目立つ。
	トンネル マルチ	氷見市	0.9	100	晩抽春のいぶき 天寶	50 30	2/25 (2/27)	3/14 (3/14)			並	並		収穫は5月末で終了
にんじん	春まき	富山市 (あおば全域)	0.2	100	彩誉	70	3/8 (3/13)	3/15 (4/10)			並	並		根重60~70g
		高岡市	0.6	300	紅うらら	100	3/25 (4/20)	3/26						本葉8枚展開
		砺波市	0.2	前年 無	紅うらら	100	3/20 (-)	3/20 (-)			早	並	不織布のべたがけによる生育促進	不織布のべたがけ区は生 葉6.5~7.5枚で30cm程度、 べたがけ無区は生葉6.0枚 で25cm程度
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	190	99	ターザン もみじ3号	90 10	8/22 (-)	9/6 (-)	10/11 (-)	11/11 (-)	6月3日から 掘り取り開始 (早生:サカタ ニ)	並~やや良	定植前の事前排 水対策の徹底と 暖冬	ターザン:ほぼ全圃場倒伏(6 月5日頃から根葉切開始→6 月14日頃から掘上開始) もみじ:倒伏始め~ほぼ倒伏
にんにく	普通	南砺市 (城端)	2.3	100	上海早生 嘉定	87 13	(-)	(-)	9/27 (-)	10/22 (-)	やや早い 6/7より随時 収穫開始(前 年6/12~)	並	暖冬傾向による積 雪期間の縮小	生葉数2~3枚 鱗球は肥大し収穫適期
さといも	普通	入善・朝日 (見込み)	4.0	100	大和	100			4/15	6/上	やや遅い	並	4月の低温	出芽中
		上市町 (見込み)	10.0	100	大和	97			4/3 (4/3)	6/5 (6/6)	並	並	乾燥により5月定植 では、やや生育遅 れ	生育は概ね良好
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/9 (4/15)	5/25 (5/25)	並	並		本葉2~3枚展開
		小矢部 (福岡含む)	3.8	86	大和	100			4/20 (4/26)	4/22 (4/27)	並	並		本葉2~3枚展開
		砺波市	2.7	158	大和	95			4/27	5/5	やや早い	並	5月高温傾向により、 5/24から芽出し作業開 始(例年6月から)	生葉数2~2.5枚、草丈 20cm 6/5頃に芽が出揃う
		南砺市 (福野)	12	102	石川早生 大和	30 60			4/24 5/5	5/下 6/6	平年並み ~やや早 い	並	早く植付けたほ場 にて、同上	早生は生葉数1.5~2.5枚、草丈20cm 大和は生葉数0.5~1.5枚、草丈15cm
		南砺市 (井波)	10.5	94	大和	90			5/4	6/上	平年並み ~やや早 い	並	早く植付けたほ場 にて、同上	生葉数0.5~2枚 定植日より生育差がある。
		ばれいしょ	春植え	魚津市	0.2	100	男爵	80			3/25		並	並
富山市 (なのほな、富山)	5.3			106	男爵 とうや	53 47			3/20 (3/25)	4/6 (4/10)	並	並	茎数 とうや:2.8本/株 男爵:3.3本/株	概ね生育順調。
射水市	0.8			80	とうや	100	-	-	3/26 (3/28)	3/27 (3/29)	並	不良	砕土率低下	生育ムラが大。一部で生育が 良いが半分以上で生育不良
高岡市	4.8			145	男爵 ニシユタカ	38 38	-	-	3/20 (3/25)	3/27 (4/4)	並	並		一部で乾燥による萎れ発生