

富山県加工業務用野菜等供給拡大推進協議会

【事務局】 富山県農林水産部 農業技術課 広域普及指導センター
TEL 076-429-5041 FAX 076-429-5049

野菜生育情報(7月8日現在)

※()の値は、前年実績

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | 播種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 |
| 白ねぎ | 秋まき 初夏どり | 氷見市 | 0.4 | 100 | 羽緑一本太 | 100 | 8/20 (9/10) | 9/20 (9/20) | 10/1 (10/25) | 11/1 (11/4) | 早い | 並 | 2~3月の暖冬 | 多くの株で抽たい発生 |
| | 春まき 秋冬どり | 黒部市 | 12.4 (見込み) | 100 | 夏扇4号 | 48 | 11/1 | 5/上 | 3/25 | 6/10 | 並 | 並 | | 草丈85cm、生葉数5.5枚、 太さ21mm程度(1/20播種、 3/26定植) 4~5月定植は概ね順調に 生育 |
| | | | | | 夏山一本太 | 34 | (1/15) | (5/上) | (3/28) | (6/15) | | | | |
| | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 富山市 八ヶ山 | 1.5 (見込み) | 100 | 夏扇4号 | 55 | 2/15 | | 4/15 | | 並 | 並 | | 4月中旬定植で草丈65cm、 生葉数6枚 |
| | | 中央 | 6.2 (見込み) | 100 | 夏扇4号 | 70 | 1/10 | 5/上 | 3/26 | 6月 | 並 | 並 | 5月~6月2半旬までの乾燥 | 3月下旬定植で草丈70cm、 生葉数4.5枚(夏扇パワー) |
| | | 富山市 (大沢野) | 3 (見込み) | 85 | 関羽一本太 | 40 | 1/30 | 3/30 | 4/6 | 5/8 | 並 | 並 | | 生育は概ね良好 草丈60cm、茎径17mm |
| | | 富山市 (大山) | 2.0 | 90 | 夏扇パワー | 30 | (1/31) | (3/30) | (4/5) | (5/20) | 並 | 並 | | 生育は概ね良好 草丈62cm、茎径17mm |
| | | 立山町 | 9.0 (見込み) | 90 | 夏扇4号 | 70 | 2/15 | 3/26 | 4/6 | 4/29 | 並 | 並 | | 定植後生育はおおむね良好 4月上旬定植で草丈60cm、生葉数4.5枚 |
| | 春まき 夏秋どり | 射水市 | (9.0) | (100) | 夏扇パワー | (30) | 1/中 | | 3/25 | | 並 | 並 | 5~6月上旬の乾燥 | 生育順調 |
| | | 氷見市 | 3.0 | 100 | 龍美 | 40 | 1/5 | 1/20 | 3/5 | 4/10 | 1週間程度早 い | 並 | | 生育順調、0.5~1%ほど抽 たい散見 |
| | 春まき 秋冬どり | 射水市 | (4.0) | (100) | 関羽一本太 | (30) | (3/20) | (4/15) | (4/13) | (6/15) | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 氷見市 | 4.0 | 100 | ホワイトソード | 40 | 2/1 | 3/25 | 4/12 | 5/2 | 並 | 並 | | 草丈50~60cm、現在の生 育順調 |
| 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 砺波市 | 5 | 94 | 関羽 | 70 | 1/9 | | 3/27 | 6/6 | 平年並み(オリ ゼメート粒剤 不足のため減 肥して栽培) | 並 | 5月の乾燥→7月の多雨 | 草丈50~60cm、生葉数4~ 5枚 | |
| | 南砺市 (城端) | 1(見込み) | 100 | ホワイトスター | 90 | 2/5 | 3/15 | 4/10 | 5/25 | 平年並み | 並 | 5月の乾燥→7月の多雨 | 草丈90cm、生葉数5~6枚 | |
| 短葉性ねぎ | 春まき 夏秋 どり | 黒部市 | 1.1 (見込み) | 69 | 越中なつ小町 | 68 | 1/14 | 3/12 | 3/26 | 5/上 | 並 | 並 | | 3/26定植で7/9収穫予定。 なつ小町は最終土寄せ終 了、ふゆ小町の一部も最終 土寄せ終了 |
| | | 魚津市 | 1.1 | 100 | 越中なつ小町 | 30 | 1/10 | 1/24 | 3/27 | 4/17 | 並 | 並 | | 3/27、4/8定植のなつ小町 が7/9収穫予定 |
| ほうれんそう | 周年 | 富山市 (富山) | 3 (見込み) | 100 | | | 周年 | | | | | | | 概ね順調 |
| | | 高岡市 | 11.0 | 100 | ジャスティス | 80 | - | - | - | - | 並 | 並 | 6月以降の降雨 | 露地栽培のうねの外側が湿 害により生育不良 施設は生育順調 |
| こまつな | 周年 | 魚津市 | 0.3 | 100 | なつきの のりちゃん | 50 | 周年 | | - | - | 並 | 並 | | 出芽生育揃い良好。一部ハ ウスにて雑草が多い。 |
| | | 富山市 (JAなのはな) | 5.8 | 100 | 春のセンバツ | 30 | 周年 | | | | 並 | 並 | | 生育は概ね良好 |
| | | 富山市 (八尾・大沢野) | 0.5 | 100 | なつき | 100 | (周年) | | | | 並 | 並 | | 生育は概ね良好 |
| | | 射水市 | (2.0) | (100) | 夏音 夏の甲子園 | (80) (20) | 周年 | 周年 | - | - | 並 | 並 | | 生育順調 |
| えだまめ | 普通 | 射水市 | 35.0 (見込み) | 95 | | 100 | 3/26 (4/5) | (7/20) | | | 並 | 並 | 6月以降の降雨 | 7月4日から収穫開始。 生育は概ね順調 カメムシ等害虫の発生が多 い。 |
| トマト | 半促成 | 魚津市 | 0.5 | 100 | アニモTY-12 | 100 | 1/上 | | 3/中 | 3/下 | 並 | 並 | | 8段目着果肥大、日照不足 により収穫遅れる。 |
| | | 富山市 (富山) | 1.3 | 72 | 桃太郎ワンダ ーその他 | 80 20 | 1/5 (1/7) | 1/15 (1/30) | 3/17 (3/20) | 4/2 (4/1) | 並 | 並 | | 収穫は終盤。6段目収穫始 め |
| | | 南砺市 | 0.4 | 100 | CF桃太郎ファ イト CFハウス桃太郎 | 60 30 | 苗購入 () () | | 2/18 () () | 3/中 () () | 平年並み(例 年10~11段 目まで着果) | 並 | 高温傾向 | 9~10段目収穫中 7/8収穫打ち止め |
| きゅうり | 半促成 | 朝日・入善 | 0.9 | 113 | ニーナ 兼備2号 | 41 39 | 1/下 (1/22) | | 2/25 (2/25) | 4/12 (4/10) | 並 | 並 | | 共販終了 |
| なす | 露地 | 上市 | 0.3 | 100 | | | | | 購入苗 | 4/30 | 5/15 | 並 | 並 | 降雨により草勢は回復。一 部でフキノメイガ、カメムシ の吸汁害発生 |
| | | 高岡市 | 0.3 | 100 | 千両2号 | 100 | 3/上 (1/15) | (1/25) | 4/27 (4/25) | (5/5) | 並 | 並 | | 定植後の生育は順調 |
| すいか | トンネル早熟 | 入善町 | 4.1 | 98 | 入善ジャンボ | 100 | 3/25 (4/3) | 4/18 (4/13) | 4/23 (4/23) | 5/3 (5/7) | 並 | 並 | | 肥大は昨年よりやや早い |
| 加工用キャベツ | 春まき | 小矢部市 (福岡含 む) | 6.8 | 84 | おきな | 49 | 2/20 | 3/12 | 4/8 | 4/24 | 並 | 並~やや不良 | 緑腐れの発生 | 「おきな」の収穫が遅れてお り、裂球や緑腐れが発生し ている。 |
| | | 南砺市 (福野) | 2 | 100 | おきな 初恋 | 70 30 | 2/20 () () | 4/5 () () | 4/中 () () | | 並 | 並 | | 他作業との競合で収穫遅れ で一部でワレ発生 |
| アスパラガス | 露地普通 (ハウス1戸) | 南砺市 (福光) | 3.3 | 100 | グリーンタワー ウインデル | 60 30 | () () | () () | () () | | 並 | | | 立茎中 |
| だいこん | トンネル | 魚津市 | 3.0 | 100 | 晩々G 晩抽春のいぶき | 40 40 | 3/31 | | - | - | 並 | 並 | | 収穫終期、割れの発生が見 られる。 |
| | トンネル | 富山市 (なのはな) | 0.1 共販分 | 33 | 天宝 | 100 | 3/25 (3/28) | 3/31 (3/31) | | | 並 | 並 | | 収穫終了 |

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | 播種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | |
|-------|-----|------------------|------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|---|---|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 |
| にんじん | 春まき | 富山市 (あおば全域) | 0.2 | 100 | 紅うらら | 70 | 3/4 (3/8) | (4/10) | () | () | 並 | 並 | | 収穫中 抽たい散見 |
| | | 高岡市 | | 50 | 紅うらら | 100 | 4/12 (3/25) | 4/12 (3/26) | — | — | 並 | 並 | | 根重110g、一部抽台がみられる。 |
| | | 砺波市 | 0.3 | 67 | 紅うらら | 100 | 3/20 () | 3/20 () | | | 早 7/3～収穫開始 | 並 | 不織布のべたがけによる生育促進 | 根茎44cm、肥大根長19cm、草丈62cm、葉重59g、根重161g程度 |
| さといも | 普通 | 入善・朝日 | 3.8 | 95 | 大和 | 100 | | | 4/5 (4/15) | 6上 (6上) | 並 | 並 | | 生育早いものは、草丈40cm、葉数5枚 |
| | | 上市町 (見込み) | 9.0 | 90 | 大和 | 97 | | | 4/9 (4/3) | 6/3 (6/5) | 並 | 並 | | 4月初旬定植ほ場は8枚目展開中、最大葉柄長40～50cm |
| | | 高岡市 (福岡除く) | 8.9 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/9 (4/15) | 5/中 (5/25) | 並 | 並 | | 本葉4～5枚展開 草丈35cm |
| | | 小矢部 (福岡含む) | 3.4 | 89 | 大和 | 100 | | | 4/24 (4/26) | 4/25 (4/27) | 並 | 並 | | 本葉5～6枚展開 草丈50cm前後 |
| | | 砺波市 | 2.7 | 158 | 大和 | 95 | | | 4/下 | 5/上 | 平年並み | 並 | 5月高温傾向により、5/24から芽出しされた(例年6月から)が、6月は少日照により若干生育停滞気味 | 生葉数5～6枚 草丈40～50cm |
| | | 南砺市 (福野) | 12 | 102 | 石川早生 大和 | 40 50 | | | 4/下 5/上 | 5/下 | 平年並み | 並 | 早く植付けたほ場にて、同上 | 早生は生葉数6～7枚、草丈60～70cm 大和は生葉数5～6枚、草丈45cm |
| | | 南砺市 (井波) | 11 | 105 | 大和 | 90 | | | 5/上 | 6/上 | 平年並み | 並 | 早く植付けたほ場にて、同上 | 生葉数4～5枚、草丈30cm |
| ばれいしょ | 春植え | 魚津市 | 0.2 | 100 | 男爵 | 80 | | | 3/25 | | 並 | 並 | | 茎葉黄化期 |
| | | 富山市 (なのはな、富山) | 6.8 | 128 | 男爵 とうや | 53 47 | | | 3/9 (3/19) | 4/8 (4/18) | 並 | 並 | | 収穫中 とうや、男爵共にL・Mサイズ多め |
| | | 射水市 | 0.7 | 88 | とうや | 100 | — | — | 3/26 (3/26) | 3/30 (3/27) | 並 | 並 | 一部で肥料の不足 | 茎葉処理済み |
| | | 高岡市 | 2.9 | 60 | 男爵 とうや | 28 34 | — | — | 3/19 (3/20) | 4/8 (3/27) | 並 | 並 | 5～6月上旬の乾燥 | いもの肥大はやや小さい。 |