

## 野菜生育情報(8月6日現在)

※播種期・定植期の下段の( )の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	12.4 (見込み)	100	夏扇4号 夏山一本太	48 34	11/1 (1/15)	5/上 (5/上)	3/25 (3/28)	6/10 (6/15)	並	やや不良	7月の長雨、日照不足	生葉数が4枚以下や生育不揃いのほ場が多く、太りや伸びがやや悪い。	
		富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	100	夏扇4号 夏山一本	55 24	2/15 (2/10)	(4/10)	4/15 (4/20)	5/5 (5/30)	並	並		4月中旬定植で草丈95cm、生葉数6枚	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 源翠	70 20	1/10 (1/15)	5/上 (4/2)	3/26 (3/31)	6月 (5/16)	並	並	7月の長雨	夏扇パワー収穫中。腐り目立つ。一部湿害目立つ 草丈90cm、生葉数5枚	
		富山市 (大沢野)	3 (見込み)	85	関羽一本太 夏扇パワー	40 30	1/30 (1/31)	3/30 (3/30)	4/6 (4/5)	5/8 (5/20)	並	並		生育は概ね良好 草丈70cm、茎径19mm	
		富山市 (大山)	2.0	90	夏扇4号 夏山一本	80	2/15 (2/15)	3/26 (3/20)	4/6 (4/1)	4/29 (5/8)	並	並		多雨の影響で茎径は細め 草丈65cm、茎径18mm	
		立山町	9.0 (見込み)	90	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7 (1/6)	4/21 (4/20)	3/26 (3/30)	6/9 (6/10)	並	並		一部湿害発生 4月上旬定植で草丈90cm、生葉数4.5枚	
		春まき 夏秋どり	射水市	(9.0)	(100)	夏扇パワー 源翠	(30) (20)	1/中 (1/10)	(3/20)	3/25 (3/20)	(4/25)	やや遅い	並		梅雨の降雨・日照不足により、葉鞘が細い傾向
			氷見市	3.0	100	龍美 夏山一本太	40 20	1/5 (1/4)	1/20 (1/18)	3/5 (3/10)	4/10 (4/10)	1週間程度早い	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	射水市	(4.0)	(100)	関羽一本太 ホワイトスター	(30) (30)	(3/20)	(4/15)	(4/13)	(6/15)	やや遅い	並		梅雨の降雨・日照不足により、葉鞘が細い傾向	
		氷見市	4.0	100	ホワイトソード 関羽一本太	40 30	2/1 (2/1)	3/25 (3/25)	4/12 (4/25)	5/2 (5/20)	並	並		草丈60~70cm、葉鞘長20cm以上となり、土寄せも20cm程度まで実施	
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	5	94	関羽 夏扇パワー	70 15	1/9 ( )	( )	3/27 ( )	6/6 ( )	平年並み~ やや遅い	並	7月の多雨多湿	草丈70cm、生葉数4枚程度	
		南砺市 (城端)	1(見込み)	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	2/5 ( )	3/15 ( )	4/10 ( )	5/25 ( )	平年並み~ やや遅い	並	7月の多雨多湿	草丈60~70cm、生葉数5枚程度	
	短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.1 (見込み)	69	越中なつ小町 越中ふゆ小町	68 32	1/14 (1/15)	3/12 (3/中)	3/26 (3/28)	5/上 (5/中)	並	並		「ふゆ小町」を収穫中。昨年よりやや細め傾向
		春まき 夏秋どり	魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	30 70	1/10	1/24	3/27 (3/25)	4/17 (4/18)	並	並		「ふゆ小町」を収穫中
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100										おおむね順調	
		高岡市	11.0	100	ミラージュ タフスカイ	80 10	-	-	-	-	並	並	高温	高温で生育が停滞	
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	なつき 浜ちゃん	70 30	周年				並	並		生育順調	
		富山市 (JAなのはな)	5.8	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育は概ね良好	
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なつき	100	(周年)				並	並		生育は概ね良好	
		射水市	2.0	100	夏音 夏の甲子園	(80) (20)	周年	周年	-	-	並	並		高温で生育が停滞	
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	35.0 (見込み)	95	たんくろう	100	3/26 (4/5)	(7/20)	-	-	やや遅い	不良	6月以降の降雨、日照不足	梅雨の降雨、日照不足の影響が着莢数が減少している。また、サヤの肥大が遅れており、収穫機のローテーションの関係で早どりとなったほ場の単収低下。6月以降のは種では草丈が短い傾向	
きゅうり	抑制	入善・朝日	0.6 (見込み)	100	兼備2号	90	7/上		7/下	8/上	並	並		急な高温で、苗のしおれがみられる。	
	抑制	富山市 (八ヶ山)	0.7 (見込み)	90	兼備2号 T178	50 50			8/5 (8/5)		並	並		8/5から本格的に定植始まる。	
	抑制	富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	100	兼備2号	80	購入苗				並	並		ポットに入れ替え中	
なす	露地	上市	0.3	100				購入苗	4/30 (4/26)	5/15 (5/6)	並	並		一部アブラムシ発生	
	露地	高岡市	0.3	100	千両2号	100	3/上 (1/15)	(1/25)	4/27 (4/25)	5/5 (5/5)	並	並		生育順調	
すいか	トンネル早熟	入善町	4.1	98	入善ジャンボ	100	3/25 (4/3)	4/18 (4/13)	4/23 (4/23)	5/3 (5/7)	並	やや不良	7月の長雨	収穫終盤 2番果収穫7/28~	
キャベツ (生食用)	夏まき 秋冬どり	入善町	2.1 (見込み)	77	おきな 輝吉	70 15	7/10 (7/9)	7/28 (7/12)			やや遅れ	並		7月の降雨のため定植作業が遅れ、老化苗となっている。	
		射水市	(2.3)	(100)	初恋 ふゆみつ	(60) (30)	7/12 (7/18)	(7/25)	8/3		並	並		定植直後もしくは育苗中 苗は生育順調	
キャベツ (加工用)	夏まき 秋冬どり	富山市 (JAなのはな)	4 (見込み)	133	おきな 輝吉	80 20	7/13 (7/18)	7/30 (7/27)	(8/11)	(8/26)	並	並	7月の寡日照	苗は一部徒長気味も生育概ね良好	
		立山町	0.4 (見込み)	10	おきな 輝吉		7/1	7/15	7/30		並	並		定植中	
		小矢部 市 (福岡含む)	13.9	71	おきな 輝吉	61 34	7/3 (7/5)	8/3 (8/1)	7/31 (7/28)		並	並		寡日照の影響で7月上旬には種の輝吉が徒長 長雨の影響で定植開始が5日遅れた	
		南砺市 (福光)	0.71	82	輝吉 おきな	56 28	7/14	7/18	8/6	8/中	平年並み	並	高温乾燥	本葉2.5枚(7/14,15は種)	
		(福野)	5.5	79	おきな	35	7/上		8/3		平年並み	並	高温乾燥	高温乾燥が続いており、萎れ散見	

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.5)	(100)	おはよう サマードーム	(50) (30)	(7/15)	(8/1)	(7/25)	(8/25)	並	並		育苗中。生育順調	
		南砺市 (福光)	0.89	52	おはよう	100	7/10	8/上	8/中	9/上	平年並み	並	高温乾燥	本葉2.5枚(7/10は種)	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウインデル	60 30	( )	( )	( )	( )	春どり栽培の みの出荷量 2.9t(前年比 94%)	やや不良	7月の多雨多湿	立茎春夏どり栽培収穫中	
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	19.0 (見込み)	127	夏の翼 秋の翼	40 30	8/3		-	-	並	並		順調には種作業が行われて いる。	
にんじん	夏まき 秋冬どり	富山市 (あおば全域)	13	108	愛紅 彩誉	60 20	7/20	(7/20)	(8/15)	( )	( )	並	並		7月は種のにんじんは発芽始め 発芽率平均約80%
		高岡市	10.0		愛紅 紅ひなた	40 20	7/20					並	並		早まきは発芽揃いとなって いる。
		砺波市 南砺市	20	91	愛紅 紅ひなた	80 15	7/17	( )	( )	( )	( )	一部は種遅れ	並	7月の多雨	7/17は種で本葉は2枚ほど
		南砺市 (福光)	3.2	222	愛紅 紅ひなた	64 36	7/21	( )	( )	( )	( )	一部は種遅れ	並	7月の多雨	7/21は種で本葉は1枚ほど
さといも	普通	入善・朝日	3.8	95	大和	100			4/5	6上	並	並		葉柄長80~90cm、生葉数5 ~6枚。生育は概ね順調、 前年並み。	
		上市町 (見込み)	9.0	90	大和	97			4/9	6/3	並	並		4月初旬定植ほ場は9枚目 展開中、最大葉柄長90~ 100cm	
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/9	5/中	並	並		本葉5枚展開 草丈70cm	
		小矢部 (福岡含む)	3.4	89	大和	100			4/24	4/25	並	並		本葉5~6枚展開 草丈100cm前後	
		砺波市	2.7	158	大和	95			4/下	5/上	平年並み	並		生葉数5~6枚、葉柄長90 ~100cm 葉長55~60cm、葉幅40~ 45cm	
		南砺市 (福野)	12	102	石川早生 大和	40 50			4/下	5/下	平年並み	並	同上	「大和」で生葉数5枚程度、 葉柄長115~120cm、葉長55 ~60cm、葉幅35~40cm	
		南砺市 (井波)	11	105	大和	90			5/上	6/上	平年並み	並	同上	ほ場間で差が見られ、生葉 数 5枚程度、葉柄長約65~ 70cm、 葉長45~50cm、葉幅30~ 40cm	