

野菜生育情報(9月9日現在)

※播種期・定植期の下段の()の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨 年 比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	12.4 (見込み)	100	夏扇4号	48	11/1	5/上	3/25	6/10	遅い (1~4週間)	やや不 良	7月の長雨、日照不足、8月 の高温、乾燥	生葉数の減少や生育不揃 いのほ場が多く、太りや伸 びが悪い。
					夏山一本太	34	(1/15)	(5/上)	(3/28)	(6/15)				
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	100	夏扇4号	55	2/15		4/15	5/5	並	並	高温乾燥	高温乾燥による葉先枯れ散 見も、生育概ね良好 草丈90cm、軟白長25cm
					夏山一本	24	(2/10)	(4/10)	(4/20)	(5/30)				
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号	70	1/10	5/上	3/26	6月	並	並	高温乾燥	源翠収穫開始。 一部ハモグリバエ類の発生 目立つ。
					源翠	20	(1/15)	(4/2)	(3/31)	(5/16)				
		富山市 (大沢野)	3 (見込み)	85	関羽一本太	40	1/30	3/30	4/6	5/8	並	並	ハモグリバエ食害多発により 一部出荷延期	ハモグリバエ類による食害が多発
		夏扇パワー	30	(1/31)	(3/30)	(4/5)	(5/20)							
	富山市 (大山)	2.0	90	夏扇4号	80	2/15	3/26	4/6	4/29	並	並		多雨の影響で茎径は細め 出荷中	
	夏山一本		(2/15)	(3/20)	(4/1)	(5/8)								
	立山町	9.0 (見込み)	90	夏扇パワー	15	1/7	4/21	3/26	6/9	並	並		一部軟腐病発生	
				夏扇4号	70	(1/6)	(4/20)	(3/30)	(6/10)					
	春まき 夏秋どり	射水市	(9.0)	(100)	夏扇パワー	(30)	1/中		3/25		並	並		葉鞘が細い傾向、一部のほ 場でハモグリバエ類の多発 で生育不良
					源翠	(20)	(1/10)	(3/20)	(3/20)	(4/25)				
	氷見市	3.0	100	龍美	40	1/5	1/20	3/5	4/10	並	並		8月中旬以降の高温下でや や生育停滞	
夏山一本太				20	(1/4)	(1/18)	(3/10)	(4/10)						
春まき 秋冬どり	射水市	(4.0)	(100)	関羽一本太	(30)					並	並		葉鞘が細い傾向、一部のほ 場でハモグリバエ類の多発 で生育不良	
				ホワイトスター	(30)	(3/20)	(4/15)	(4/13)	(6/15)					
氷見市	4.0	100	ホワイトソード	40	2/1	3/25	4/12	5/2	やや遅い	並		葉鞘長20cm以上となり、土 寄せも20cm程度まで実施し たが、8月中旬以降の高温 下で生育停滞		
			関羽一本太	30	(2/1)	(3/25)	(4/25)	(5/20)						
春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	5	94	関羽	70	1/9		3/27	6/6	やや遅い	並	・7月の多雨多湿 ・8月の高温乾燥	草丈60~70cm程度 太りが悪く、細い傾向 葉先枯れ多	
				夏扇パワー	15	()	()	()	()					
南砺市 (城端)	1(見込み)	100	ホワイトスター	90	2/5	3/15	4/10	5/25	平年並み~ やや遅い	並	・7月の多雨多湿 ・8月の高温乾燥	草丈60~70cm程度 生葉数5~6枚程度 収穫開始時期は例年通り		
			源翠・夏山一本太	10	()	()	()	()						
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.1 (見込)	69	越中なつ小町	68	1/14	3/12	3/26	5/上	並	並		出荷者1名、残り3a程度で ほぼ出荷終了
					越中ふゆ小町	32	(1/15)	(3/中)	(3/28)	(5/中)				
魚津市	1.1	100	越中なつ小町	30	1/10	1/24	3/27	4/17	並	やや不 良		8/27で出荷終了		
			越中ふゆ小町	70			(3/25)	(4/18)						
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年					高温	一部で高温による発芽不良	
					高岡市	11.0	100	ミラージュ	80	-	-	-	-	並
タフスカイ	10													
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	なつき	70	周年				並	並		生育順調 一部のハウスで は雑草が多い。
					浜ちゃん	30								
	周年	富山市 (JAなのはな)	5.8	100	春のセンバツ	100	周年				並	並	高温	一部で高温による発芽不良
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なつき	100	(周年)							
周年	射水市	2.0	100	夏音	(80)	周年	周年	-	-	並	並		生育はおおむね順調。一部 でスベリヒユの発生により 生育不良	
夏の甲子園	(20)													
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	35.0 (見込み)	95	たんくろう	100	3/26	8/4	-	-	並	並		生育は概ね順調
						(4/5)	(7/20)							

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
きゅうり	抑制	入善・朝日	0.6	100	兼備2号	90	7/上		7/下	8/中	並	並		高温の影響で、一部で葉焼けや尻細果がみられる。	
	抑制	富山市 (ハケ山)	0.7 (見込み)	90	兼備2号 T178	50 50			8/5 (8/5)	8/22 (8/22)	並	並	高温	高温による葉焼け、曲がり果目立つ。ハウス内高温により管理作業進まず。	
	抑制	富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	100	兼備2号	80	購入苗		8/10		並	並		草勢低下に伴う先細り果の発生	
なす	露地	上市	0.3	100					購入苗	4/30 (4/26)	5/15 (5/6)	並	並		一部アブラムシ発生
	露地	高岡市	0.3	100	千両2号	100	3/上 (1/15)	1/25 (1/25)	4/27 (4/25)	5/5 (5/5)	並	並		8月より、病害による立枯れ症状が目立ち、8月下旬で収穫を終了した。	
加工用キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	2.1	77	おきな 輝吉	70 15	7/10	7/28	8/6	8/20	並	並		定植30日で最大葉長25~35cmとなっている。一部ほ場で雑草繁茂し生育遅れ	
		富山市 (JAなのはな)	4 (見込み)	133	おきな 輝吉	80 20	7/13 (7/18)	7/30 (7/27)	8/8 (8/11)	8/24 (8/26)	並	並	高温乾燥	高温により定植後の活着不良目立つ。	
		立山町	1 (見込み)	10	おきな 輝吉		7/1	7/15	7/30	8/2	並	並	高温乾燥	生育ムラ、欠株発生	
		小矢部市 (福岡含む)	13.9	71	おきな 輝吉	61 34	7/3 (7/5)	8/3 (8/1)	7/31 (7/28)		並	やや不良	定植後に根が枯死し、欠株が一部ほ場で多発	8月上旬定植のほ場の定植30日後の最大外葉長は、「おきな」で28cm、「輝吉」で23cm 8/1定植の「おきな」で結球開始	
		南砺市 (福光)	0.71	82	輝吉 おきな	56 28	7/9	7/14	8/6	8/17	やや遅い	やや不良	8月の高温乾燥	早まきで生葉数14枚程度、最大葉長28cm程度、定植後うね間かん水実施したが活着不良により欠株発生	
		(福野)	5.5	79	おきな	35	7/8		8/2	9/上	並	並	8月の高温乾燥	生葉数12~14枚程度	
キャベツ	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.3)	(100)	初恋 ふゆみつ	(60) (15)	7/12 (7/18)		8/3 (7/25)		並	並		8月3日定植で葉長約30cm	
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.2 (見込み)	100	黄楽70 あきめき	40 40	8/6		8/28		並	並		8月下旬定植で葉数7~8枚、最大葉長18cm 平年並み	
	夏まき 秋冬どり	高岡市	0.5	50	黄ごころ65 晴黄75	60 40	8/3 (8/3)	8/27 (8/17)	8/25 (9/2)	9/11 (9/15)	並	並		早まき是本葉10枚	
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.5)	(100)	おはよう サマードーム	(50) (30)	(7/15)	(8/1)	8/10 (7/25)	8/25 (8/25)	並	並		生育順調、早いもので本葉10~12枚	
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	0.89	52	おはよう	100	7/16	8/5	8/18	8/30	並	並	8月の高温乾燥	生葉数8枚程度、草丈15cm程度	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウインデル	60 30	()	()	()	()	並	やや不良	7月の多雨多湿 8月の高温乾燥	立茎収穫中	
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	17.0 (見込み)	95	夏の翼 秋の翼	40 30	8/3		-	-	並	並		8月中旬は種のほ場の一部で植え付け深度が浅かったため発芽不良がみられる。	
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100					(8/19)	(10/5)			高温乾燥	一部で高温による発芽不良	
大かぶ	露地 夏まき	高岡市	6.8	100	早生大かぶ 京千舞	20 80	8/12 (8/23)	9/11 (9/20)			並	並		発芽揃い良好 早まき是本葉10枚	
	露地 夏まき	南砺市 (福光)	2.7	117	早生大かぶ	100	8/21	9/中			平年並み	やや不良	8月の高温乾燥	早まき葉数3~4枚 発芽率3~5割程度	

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
にんじん	夏まき	富山市 (あおば全域)	13	108	愛紅 彩誉	60 20	7/20 (7/20)	8/26 (8/15)	()	()	並	並		平均株立ち率 70%
		高岡市	9.7	97	愛紅 紅ひなた	40 20	7/20	9/15			並	並		ほ場によっては苗立率が悪い。 一部高温乾燥で立枯れ多く、再は種
		砺波市 南砺市	20	100	愛紅 紅ひなた	80 15	7/17 () ()	() ()	() ()	やや遅い	やや不良	・7月の多雨多湿 ・8月の高温乾燥	うね間かん水ほ場の発芽率が悪い。	
		南砺市 (福光)	3.3	234	愛紅 紅ひなた	63 37	7/21 () ()	8/17 () ()	() ()	並	並	・7月の多雨多湿 ・8月の高温乾燥	発芽率5~9割程度、(平均7割) 早まきは生葉数5~7枚程度	
さといも	普通	入善・朝日	3.8	95	大和	100			4/5 (4/15)	6上 (6上)	並	並		草丈110~130cm、葉枯れがみられるほ場がある。
	普通	上市町 (見込み)	9.0	90	大和	97			4/9 (4/3)	6/3 (6/5)	並	並		4月初旬定植ほ場は12枚目展開中、最大葉柄長140~150cm
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/9 (4/15)	5/中 (5/25)	並	並		本葉5枚展開 草丈100cm
	普通	小矢部 (福岡含む)	3.4	89	大和	100			4/24 (4/26)	4/25 (4/27)	並	並		本葉5~6枚展開 草丈130cm前後
	普通	砺波市	2.7	158	大和	95			4/下	5/上	並	並	8月の高温乾燥	葉柄長110~120cm程度 生葉数4枚程度
	普通	南砺市 (福野)	12	102	石川早生 大和	40 50			4/下 5/上	5/下	並	並	同上	早生:8/30から個選、9/6から共選開始 草丈130~140cm、生葉数4~5枚 大和:草丈140~150cm、生葉数4~5枚
	普通	南砺市 (井波)	11	105	大和	90			5/上	6/上	並	並	同上	草丈100~130cm、生葉数4~5枚、
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	145	83	ターザン スタリオン	85 15	8/28	9/7	10中	11上		並	ハウス内の抑温対策の徹底と発芽までのかん水回数増。	発芽期、発芽は概ね良好