

野菜生育情報(11月9日現在)

※は種期・定植期の下段の()の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	12.6	102	夏扇4号 夏山一本太	51 36	11/4 (11/1)	5/上 (5/上)	3/19 (3/25)	6/9 (6/上)	やや遅い	やや不良	お盆頃の多雨、連作ほ場等	生育停滞ぎみのほ場は回復傾向。一部のほ場では棒ねぎになるおそれあり。
		富山市 八ヶ山 中央	1.5 6.2	100 100	夏扇4号 源翠	80 10	2/上中 (2/10)	(4/10)	4/16 (4/20)	(5/30)	並	やや不良	白絹病の発生	草丈約100cm、生葉数7~8枚。
		富山市 (大沢野)	1.9	51	夏扇4号 関羽一本太	40 35	1/11 (1/15)	5/上 (4/2)	3/19 (3/31)	6/9 (5/16)	並	並		草丈約105cm、生葉数7~8枚。生育おおむね良好。一部で雑草繁茂による生育不良。
		富山市 (大山)	0.7	100	夏扇4号 夏山一本	80	2/15 (2/15)	3/26 (3/26)	4/6 (4/1)	4/12 (5/8)	並	並		一部湿害により生育停滞。土寄せ作業遅れにより、軟白長が短い。
		立山町	9.0	90	夏扇4号 夏扇4号	15 70	1/5 (1/7)	(4/21)	3/24 (3/26)	5/20 (6/8)	並	並		おおむね順調
		射水市	3.8	(100)	関羽一本太 ホワイトスター	(30) (30)	2/20 (2/20)	4/10 (4/10)	4/15 (4/15)	(5/29)	やや遅い	やや不良	8月中旬の大雨による湿害、ハモグリバエ多発、雑草繁茂	葉鞘が細い傾向。雑草多発ほ場では土寄せができていない。
		氷見市	2.5	100	秋の宝山 ホワイトソード	40 20	2/1 (2/1)	3/20 (3/25)	4/10 (4/12)	5/11 (5/2)	並	並		草丈70~80cm、葉鞘長30cm、生育不良は回復した。
		砺波市	5	100	関羽	100	1/下 ()	4/下 ()	4/上 ()	6/上 ()	並	並	7月下旬の高温 8月中旬の降雨	収穫中
		南砺市 (城端)	0.8	80	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	1/下 ()	4/下 ()	4/上 ()	5/中 ()	並	並	7月下旬の高温 8月中旬の降雨	収穫中
		ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年			並	並	
	周年	高岡市	11.0	100	ハンター	50	-	-	-	-	並	並		「ハンター」の生育はやや遅いが、全体的には生育順調。
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	浜つづき	100					並	並		生育はおおむね順調でそろっている。
	周年	富山市 (JAなのはな)	5.8 (見込み)	100	冬里	60	周年				並	並		生育はおおむね良好
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	はまつづき	100	(周年)				並	並		生育はおおむね良好
	周年	射水市	2.0	(100)	はまつづき 冬里		周年	周年	-	-	並	並		生育はおおむね順調
キュウリ	抑制	富山市 (八ヶ山)	0.6	90	兼備2号 T178	50 50			8/7 (8/5)	(8/22)	並	並		ウイルス病により奇形果が発生。立枯れ症状の発生。
	抑制	富山市 (南部施設)	0.2	100	兼備2号	80	購入苗				並	並		収穫終期。先細り果が多くみられる。
ナス	露地	上市	0.3	100			購入苗		4/30 (4/26)	5/10 (5/6)	並	並		出荷中。まもなく出荷終了。
加工用キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	0.9	43	おきなSP	100	7/12 (7/10)	7/27 (7/28)	7/30 (8/6)	8/20 (8/20)	並	並		肥大良好、一部割れがみられるが、計画通り出荷できる見込み。
		富山市 (JAなのはな)	4	100	おきなSP 輝吉	75 20	7/20 (7/13)	7/30 (7/30)	8/11 (8/8)	8/31 (8/24)	並	並		8月下旬定植で、球重約2kg。一部でアントシアンが発生。
		小矢部 市 (福岡含 む)	17.5	126	おきなSP 輝吉	70 30	7/5 (7/3)	(8/3)	7/31 (7/31)	9/15 (9/2)	やや遅い	やや不良	8月中旬の大雨による湿害により、生育が遅延。	8月上旬定植ほ場では、収穫が始まっている。一部種り遅れ等により裂球が発生している。8月下旬定植ほ場では、おおむね順調に肥大している。
		南砺市 (福光)	0.61	85	輝吉 おきな	58 42	6/2	7/25	7/20	8/22	やや遅い	並	8月中旬の降雨	10/18~随時出荷中。一部品種の収穫物でチップバーン発生。
		南砺市 (福野)	3	79	おきな THY105	33 33	7/上中		8/9	9/3	やや遅い	やや不良	9/6降雹	11/5から順次収穫開始(昨年より20日ほど遅い)。また球重はやや軽い。
キャベツ	夏まき 秋冬どり	射水市	2.3 (見込み)		初恋 冬みつ		7/12 (7/12)		8/6 (8/3)		並	並		8月上旬定植の「初恋」は収穫終了。8月中旬定植の「初恋」の一部が湿害でやや生育不良。8月末定植の「冬みつ」は球径16cm程度となっている。
はくさい	夏まき	魚津市	1.6	100	黄楽70 あきめき	50 30	8/5		8/27 (9/16)	9/中	並	やや不良		順調に生育しており、9月上旬定植のほ場を収穫中。昨年より小さい球が多く、平年並の大きさである。10/20から共同出荷
	夏まき 秋冬どり	高岡市	0.5	100	黄ごころ65 きらぼし70	60 20	8/3 (8/3)	8/28 (8/17)	8/25 (9/2)	9/17 (9/15)	並	並		早い品種は収穫中。一部苗の生育むらによる生育の不ぞろいほ場あり。
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5 (見込み)	(100)	おはよう サマードーム	(50) (30)	(7/15)	(8/1)	8/6 (7/25)	(8/25)	並	並		8月上旬定植はおおむね収穫終了。一部排水不良ほ場で下葉が枯れている。
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	1.1	124	おはよう	100	7/9	7/31	8/4	8/26	やや早い	並		8月下旬定植では10月上旬に発蕾し、随時収穫中。

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3 <small>※収穫可能なほ場のみ</small>	100	グリーンタワー ウインデル	60 30	() ()	() ()			並	並	8月中旬の降雨	春どり・長期どり栽培は草丈2m以上、1年株養成春一期どり栽培は草丈150cm程度
だいこん	秋冬どり	魚津市	18.7	109	夏の翼 秋の翼	40 30	7/31 (8/3)	9/21 (9/15)	-	-	やや早い	並		例年より早く生育している。現在は9月上旬は種のほ場を収穫中。病害虫の被害がほぼないほ場が多い。
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	0.4	100	CRもちばな 碧寿	50 30	8/21 (8/18)	9/下 ()			並	並		9月6日は種で、根径約12cm。
大かぶ	露地 夏まき	富山市 (婦中)	4.5	100	CR京千舞	100	8/23 (8/27)	9/21 (9/6)			並	並		9月10日は種で根径14cm
		高岡市	6.8	100	早生大かぶ 京千舞	20 80	8/20 (8/23)	9/10 (9/20)			並	並		生育順調、根径12cm
		南砺市 (福光)	3.0	111	早生大かぶ	100	8/25	9/18	-	-	並	並		LMサイズ中心に随時収穫
にんじん	夏まき	富山市 (あおば全域)	14	107	愛紅 彩誉	70 20	7/20 (7/20)	8/29 (8/15)	() ()	() ()	1週間程度遅い	並		収穫中。
	夏まき	高岡市	9.5	100	愛紅 紅ひなた		7/19 (7/20)	8/31			並	並		一部で青首が発生。腐敗はみられない。
	夏まき	砺波市 南砺市	16	80	愛紅 紅ひなた	75 20	7/21 () ()		10/15 () ()		現在40%程度 収穫終了	並	7月下旬の高温 8月中旬の降雨	7月下旬は種で10/15から 収穫開始。
	夏まき	南砺市 (福光)	6.6	200	愛紅 紅ひなた	48 37	7/20 () ()	8/30 () ()	() ()	() ()	並	並	7月下旬の高温 8月中旬の降雨	7月下旬は播で10/18~ 収穫開始。8月上旬は播で 11/12~収穫開始予定。
さといも	普通	入善・朝日	3.6	90	大和	100			4/7 (4/5)	6/上	並	並		いもの肥大は良好。出荷は計画通り行われており、2割程度出荷終了。
	普通	上市町	12.0	100	大和	100			4/5 (4/9)	6/2 (6/5)	並	並		出荷は計画通り行われている。
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/6 (4/15)	5/中	並	並		収穫終了、芋の肥大は平年並。
	普通	小矢部 (福岡含む)	3.4	100	大和	100			4/20 (4/24)	4/22 (4/25)	並	並		現在収穫中、芋の肥大は平年より良好。
	普通	砺波市	1.2	44	大和	95			5/8	6/中	やや遅い	並	9/6雹害	10/15から収穫開始
	普通	南砺市 (福野)	11.8	99	石川早生 大和	40 50			4/20 5/10	5/下	並	やや不良~ 不良	9/6雹害	早生:9月末出荷終了 大和:10月12日~積雪まで 収穫。やや小さく、形が悪い。 一部子芋から葉が出ている。
	普通	南砺市 (井波)	11	100	大和	90			5/5	6/上	並	やや不良~ 不良	9/6雹害	10/15から収穫開始。やや 小さい。
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	130	88	ターザン もみじ3号	95 5	8/27		10/14	11/上	11/2現在約 95%で定植終了。	並	定植時期は比較的晴れた日 が多かった。	晴れ間をみて順次定植実施。
にんにく	露地普通	南砺市 (城端)	1.9 (見込み)	109	上海早生 嘉定	90 10			9/25	10/30	並	並		生葉数4~6枚程度 一部カラスにより、欠株 あり。