

野菜生育情報(6月9日現在)

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | は種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | | |
|--------|------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 | |
| 白ねぎ | 春まき 春どり | 射水市 | 3.2 | 100 見込 | 吉晴 春川 | 60 39 | 4/20 (4/20) | 5/25 (5/25) | 6/15 (6/15) | 6/26 (6/26) | 2週間程度遅い | 並 | | 出荷終了 | |
| | | 氷見市 | 1.2 | 100 | 羽根緑一本太 吉晴 | 70 30 | 4/15 (4/1) | 4/25 (4/25) | 6/5 (6/19) | 6/20 (6/20) | | 並 | | 出荷量22t(前年比80%)であったが、平年並 | |
| | 秋まき 初夏どり | 氷見市 | 0.4 | 100 | 羽根緑一本太 | 100 | 9/10 (8/20) | 9/15 (9/20) | 10/24 (10/1) | 11/4 (11/1) | 収穫は前年から5日ほどの遅れ | 並 | 1~2月の雪 | 抽たいは10~20% | |
| | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 黒部市 | 見込み | 12.6 | 102 | 夏扇4号 夏山一本太 | 51 36 | 11/4 (11/1) | 5/上 (5/上) | 3/19 (3/25) | 6/9 (6/上) | 並 | 並 | | 定植後の活着はほぼ順調。草丈43cm、生葉数3.6枚、太さ10.9mm(1/28播種、4/7定植、夏山一本太)。霜害、強風等から回復。 |
| | | | 富山市 八ヶ山 | 見込み | 1.5 | 100 | 夏扇4号 源翠 | 80 10 | 2月上旬 (2/10) | | 4/16 (4/10) | | 並 | 並 | 定植後生育おおむね良好であるが、一部生育むらが発生 4月下旬定植で、草丈45~50cm、生葉数4~5枚 |
| | | 中央 | 見込み | 6.2 | 100 | 夏扇4号 関羽一本太 | 40 35 | 1/11 (1/15) | 5/上 (4/2) | 3/19 (3/31) | 6/9 (5/16) | 並 | 並 | 生育はおおむね良好 4月上旬定植で、草丈55~60cm、生葉数5~6枚 | |
| | | 富山市 (大沢野) | 見込み | 3 | 85 | 関羽一本太 夏扇パワー | 40 30 | 1/30 (1/30) | 3/30 (3/30) | 4/6 (4/6) | 6/7 (6/8) | 並 | 並 | 生育はおおむね良好 草丈25cm、生葉数2.5枚 | |
| | | 富山市 (大山) | 見込み | 2.0 | 90 | 夏扇4号 夏山一本 | 80 | 2/15 (2/15) | 3/26 (3/26) | 4/6 (4/1) | 4/12 (5/8) | 並 | 並 | 一部強風による葉折れ 草丈40cm、生葉数3.5枚 | |
| | | 立山町 | 見込み | 11.0 | 100 | 夏扇パワー 夏扇4号 | 15 70 | 1/5 (1/7) | | 3/24 (3/26) | 5/20 (6/8) | 並 | 並 | 3月下旬定植で草丈56cm、葉鞘径13mm | |
| | | 春まき 夏秋どり | 射水市 | 見込み | 9 | 100 見込み | 夏扇パワー 源翠 | (30) (20) | 1/10 (1/10) | 3/1 (3/1) | 3/25 (3/25) | 4/25 (4/25) | 並 | 並 | 草丈40cm前後、生育順調 |
| | | | 氷見市 | 見込み | 3.0 | 100 見込み | 龍美 源翠 | 30 30 | 1/10 (1/5) | 2/1 (1/20) | 3/10 (3/5) | 4/5 (4/10) | 並 | 並 | 草丈40~50cm、追肥土寄せ2~3回実施でき、生育は順調 |
| | 春まき 秋冬どり | 射水市 | 見込み | 4.0 | 100 見込み | 関羽一本太 ホワイトスター | (30) (30) | 2/20 (2/20) | 4/10 (4/10) | 4/15 (4/15) | | 並 | 並 | 草丈30cm前後、生育順調 | |
| | | 氷見市 | 見込み | 2.5 | 100 見込み | 秋の宝山 ホワイトソード | 40 20 | 2/1 (2/1) | 3/20 (3/25) | 4/10 (4/12) | 5/11 (5/2) | 並 | 並 | 草丈30~40cm、定植後の生育は順調、第1~2回追肥土寄せを実施できている | |
| | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 砺波市 | 見込み | 5 | 100 | 関羽 | 100 | 1/下 () | 4/下 () | 4/上 () | | 並 | 並 | 草丈30~35cm、生葉数3~3.5枚。定植後は順調に活着 | |
| | | 南砺市 (城端) | 見込み | 1 | 100 | ホワイトスター 源翠・夏山一本太 | 90 10 | 1/下 () | 4/下 () | 4/上 () | | 並 | 並 | 5月の降雨により虫害の発生少ない 草丈60cm、生葉数4.5枚、(昨年50~60cm、4.5枚)削り込み実施 | |
| 短葉性ねぎ | 春まき 夏秋 どり | 黒部市 | 見込み | 1.1 | 100 | 越中なつ小町 越中ふゆ小町 | 67 33 | 1/22 (1/21) | 3/30 (3/12) | 3/25 (3/26) | 5/上 (5/上) | 並 | 並 | 1組織を除き、ほぼ順調に生育。草丈58cm、生葉数3.6枚、太さ13.8mm(1/22播種、3/25定植、なつ小町)。霜害、強風等から回復。 | |
| | | | 魚津市 | 見込み | 1.1 | 100 | 越中なつ小町 越中ふゆ小町 | 30 70 | 1/10 (1/7) | 1/23 (1/23) | 3/25 (3/27) | 4/21 (4/17) | 並 | 並 | 3/25定植なつ小町で草丈60cm、葉数4.5~5枚、葉鞘径12~16mm |
| | | 富山市 | 見込み | 3 | 100 | | | 周年 | | | | | | おおむね順調 | |
| ほうれんそう | 周年 | 富山市 (富山) | 見込み | 3 | 100 | | | | | | | | | 露地は生育順調、ハウスの5月は種の一部でかん水むらによる生育不ぞろい発生 | |
| | | 高岡市 | 見込み | 11.0 | 100 | ジャスティス 晩抽サンホープ | 60 20 | - | - | - | - | 並 | 並 | | |
| こまつな | 周年 | 魚津市 | 見込み | 0.3 | 100 | なつき のりちゃん | 50 50 | 周年 | | - | - | 並 | 並 | 出芽そろい良好、一部ハウスで雑草が多い。6月下旬から収穫量が増える見込み。 | |
| | | | 富山市 | 見込み | 5.8 | 100 | 春のセンバツ | 30 | 周年 | | | | 並 | 並 | 生育はおおむね良好 |
| | | 富山市 (JAなのはな) | 見込み | 0.5 | 100 | はまつづき | 100 | (周年) | | | | 並 | 並 | 生育はおおむね良好 | |
| | | 富山市 (八尾・大沢野) | 見込み | 2.0 | 100 見込み | 春のセンバツ なつき | | 周年 | 周年 | - | - | 並 | 並 | 生育順調 | |
| えだまめ | トンネルマルチ マルチ 露地直播 | 射水市 | 見込み | 37.0 | 105 | たんくろう | 100 | 3/26 (3/26) | | - | - | 並 | やや不良 | 3月下旬は種で、降霜の影響により主茎の生長点と本葉1枚目が枯死 3月下旬は種で開花期となり、一部で着莢。3月下旬~4月下旬は種で昨年より主茎長が5cm程度短い。 | |
| トマト | 半促成 | 富山市 (富山) | 見込み | 1.3 | 72 | 桃太郎ワンダー その他 | 80 20 | 1/11 (1/7) | 1/15 (1/30) | 3/20 (3/20) | | 並 | 並 | 3段目収穫中、6月上旬に摘芯 | |
| | | 魚津市 | 見込み | 0.5 | 100 | アニモTY-12 | 100 | 1/3 (1/上) | | 3/15 (3/10) | 3/26 (3/30) | 並 | 不良 | 5月の日照不足 3段目収穫中。5月の天候不良により着色不良。生産者によっては例年より早い段階で摘芯した。 | |
| きゅうり | 半促成 | 朝日・入善 | 見込み | 0.8 | 93 | 兼備2号 ニーナ | 36 21 | 1/下 (1/下) | | 3/2 (2/25) | 4/12 (4/12) | やや遅い | 並 | 4月の低温 加温は側枝果出荷盛期。無加温は側枝果の出荷始め。 | |

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | は種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | |
|---------|-----------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|----|----------------------|---|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 |
| なす | 露地 | 上市 | 0.3 | 100 | | | 購入苗 | | 4/30 (4/26) | 5/10 (5/6) | 並 | 並 | | 5月上旬定植で、草丈50cm、主枝、側枝の主要枝3本整理完了 |
| | | 高岡市 | 0.3 | 100 | 千両2号 | 100 | 3/上 (1/15) | (1/25) | 4/27 (4/25) | (5/5) | 並 | 並 | | 定植後の生育は順調 |
| キャベツ | 秋まき 春どり | 射水市 | 2.7 | 100 見込み | 春のかほりSP 中早生3号 | 40 30 | 9/20 (9/20) | 10/10 (10/10) | 10/20 (10/21) | 11/12 (11/12) | やや遅い | 並 | | 出荷終了。中早生3号の収穫が追いつかず、裂球が多かった。また、一部でチップバーンが発生した。 |
| 加工用キャベツ | 春まき 初夏どり | 小矢部市 (福岡含む) | 9.4 | 138 | おきな 初恋 | 62 38 | 2/24 (2/20) | 3/10 (3/12) | 4/1 (4/8) | (4/24) | 並 | 並 | | 定植50～60日後の球径は、初恋15cm前後、おきな:5～10cm |
| アスパラガス | 露地普通 (ハウス1戸) | 南砺市 (福光) | 3.3 | 100 | グリーンタワー ウインデル | 75 20 | () | () | () | () | | 並 | | 細いもの多くなり、多くのほ場で収穫打ち切りされている。6月10日で春どり出荷終了予定(昨年6月10日) |
| だいこん | トンネル | 魚津市 | 4.4 | 107 | 晩々G 晩抽春のいぶき | 40 40 | 3/31 | 5/15 | - | - | やや遅い | 並 | 5月の日照不足 | 根長30～35cm程度。抽たいはみられない。 |
| | トンネル マルチ | 氷見市 | 1.0 | 140 | 晩抽春のいぶき | 90 | 2/25 (2/20) | 3/20 (3/15) | () | () | 並 | 並 | | 抽たい株はほぼなく、根部肥大も良好であったが、5月3半旬の大雨でやや裂根が発生した。出荷量48t(前年比155%) |
| にんじん | 春まき | 富山市 (あおば全域) | 0.3 | 150 | 綾誉 紅ひなた | 40 60 | 3/20 (3/9) | 3/24 (4/10) | () | () | 並 | 並 | | 9葉展開 生育良好 |
| | | 砺波市 | 0.4 | 133 | 紅ひなた | 100 | 3/19 () | 3/25 () | | | 並 | 並 | 不織布のべたがけによる生育促進 | 生葉8枚、40～45cm程度、根長25cm(昨年とほぼ同) |
| さといも | 普通 | 入善・朝日 見込み | 4.0 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/7 (4/5) | 6/上 | 並 | 並 | | 萌芽そろい、葉数1～2枚 |
| | | 上市町 見込み | 10.7 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/5 (4/9) | 6/2 (6/5) | 並 | 並 | | 4月上旬定植で葉齢4枚目展開中 |
| | | 高岡市 (福岡除く) | 8.9 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/6 (4/15) | 5/中 (5/25) | 並 | 並 | | 萌芽始め、萌芽しているものは本葉2葉展開 |
| | | 小矢部 (福岡含む) | 3.4 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/20 (4/24) | 4/22 (4/25) | 並 | 並 | | 本葉2葉展開 草丈16cm |
| | | 南砺市 (井波) | 11 | 100 | 大和 | 90 | | | 5/5頃 | | 並～やや早い | 並 | 5月の降雨前に植え付けたほ場では生育早い | 生葉数2枚、草丈10～15cm(昨年比+5cm) |
| ぱれいしょ | 春植え | 富山市 (なのはな、富山) | 6.8 | 128 | 男爵 とうや | 53 47 | | | 3/9 (3/19) | 4/8 (4/18) | 並 | 並 | | 生育良好 開花終期、地上部茎長は50～60cm |
| | | 射水市 | 0.7 | 100 | とうや | 100 | - | - | 3/26 (3/24) | 3/27 (4上) | 並 | 並 | | 5月下旬に開花期となった。生育順調。 |
| | | 高岡市 | 1.0 | 32 | とうや オホーツクチップ | 47 32 | - | - | 3/20 (3/19) | 4/3 (4/8) | 並 | 並 | | 一部で湿害による生育むらが発生 |