

富山県加工業務用野菜等供給拡大推進協議会

【事務局】富山県農林水産部 農業技術課 広域普及指導センター
TEL 076-429-5041 FAX 076-429-5049

野菜生育情報(7月7日現在)

※()の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	秋まき 初夏どり	氷見市	0.4	100	羽緑一本太	100	9/10	9/15	10/24	11/4	収穫は前年から 5日ほどの遅れ	並	1~2月の雪	抽たいは10~20%、出荷量 7.5t(前年比63%)であつた が平年並
							(8/20)	(9/20)	(10/1)	(11/1)				
	春まき 秋冬どり	黒部市	12.6 見込み	102	夏扇4号	51	11/4	5/上	3/19	6/9	並	並		葉先枯れ、立枯れ症状が一部 で発生しているが、おおむね 平年並。草丈73cm、生葉数 4.2枚、太さ16.8mm(1/28播種、 4/7定植、夏山一本太)。
					夏山一本太	36	(11/1)	(5/上)	(3/25)	(6/上)				
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	1.5 見込み	100	夏扇4号	80	2月上中旬		4/16		並	並		4月下旬定植で、草丈約 65cm、生葉数6~7枚
		源翠	10	(2/10)	(4/10)	(4/20)	(5/30)							
		中央	6.2 見込み	100	夏扇4号	40	1/11	5月上	3/19	6/9	並	並		生育はおおむね良好。 4月上旬定植で草丈約 90cm、生葉数6~7枚
		関羽一本太	35	(1/15)	(4/2)	(3/31)	(5/16)							
		富山市 (大沢野)	3.0	85	関羽一本太	40	1/30	3/30	4/6	6/7	並	並		生育はおおむね良好 草丈35cm、生葉数4枚
	夏扇パワー	30	(1/30)	(3/30)	(4/6)	(6/8)								
	富山市 (大山)	2.0	90	夏扇4号	80	2/15	3/26	4/6	4/12	並	並		草丈65cm、生葉数4.5枚	
	夏山一本	70	(2/15)	(3/26)	(4/1)	(5/8)								
	立山町	10.0	90	夏扇パワー	15	1/5		3/24	5/20	並	並		3月下旬定植で草丈 100cm、葉鞘径18~20mm	
夏扇4号	70	(1/7)	(4/21)	(3/26)	(6/8)									
春まき 夏秋どり	射水市	9 見込み	100	夏扇パワー	(30)	1/10	3/1	3/25	4/25	並	並		草丈70cm前後、生育順調	
	源翠	(20)	(1/10)	(3/1)	(3/25)	(4/25)								
春まき 夏秋どり	氷見市	3.0 見込み	100	龍美	30	1/10	2/1	3/10	4/5	収穫は、前年 から14日ほど 遅れ	並		草丈60~80cm、追肥土寄せ 3~4回実施、3月定植した ほ場の生育が遅れた。	
	源翠	30	(1/5)	(1/20)	(3/5)	(4/10)								
春まき 秋冬どり	射水市	4.0 見込み	100	関羽一本太	(30)	2/20	4/10	4/15	(5/29)	並	並		草丈50cm前後、生育順調	
	ホワイトスター	(30)	(2/20)	(4/10)	(4/15)	(5/29)								
春まき 秋冬どり	氷見市	2.5 見込み	100	秋の宝山	40	2/1	3/20	4/10	5/11	並	並		草丈40~60cm、第1~2回 追肥土寄せを実施、ほ場により 生育差がある。	
	ホワイトソート	20	(2/1)	(3/25)	(4/12)	(5/2)								
春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	5	100	関羽	100	1/下	4/下	4/上	()	並	並	5月の降雨により虫害の発生 少ない	草丈60cm、生葉数4~5枚	
	()	()	()	()										
南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター	90	1/下	4/下	4/上	()	並	並	5月の降雨により虫害の発生 少ない	草丈80cm、生葉数4~5枚		
	源翠・夏山一本太	10	()	()	()	()								
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	黒部市	1.1 見込み	100	越中なつ小町	67	1/22	3/30	3/25	5/上	並	並		1組織を除き、ほぼ順調に 生育。1/22播種、3/25定植 「なつ小町」ほ場は7/6から 収穫開始。
					越中ふゆ小町	33	(1/21)	(3/12)	(3/26)	(5/上)				
魚津市	1.1	100	越中なつ小町	30	1/10	1/23	3/25	4/21	並	並		4/12定植「なつ小町」が7/8 から収穫予定。軟白長20cm 程度確保されている。		
			越中ふゆ小町	70	(1/7)	(1/23)	(3/27)	(4/17)						
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 見込み	100			周年				並	並	発芽がやや不良	
		高岡市	11.0	100	ジャスティス	60	周年	-	-	-	並	並	露地施設ともに生育順調。 露地では降雨が少ない期間 に一部で発芽不良発生。	
ミラージュ	20	()	()	()	()									
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	なつきのりちゃん	50	周年		-	-	並	並	出芽生育そろい良好。一部 ハウスで雑草が多い。	
		富山市 (JAなのはな)	5.8	100	春のセンバツ	30	周年							並
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	はまつづき	100	周年				並	並	生育はおおむね良好	
		春のセンバツ	30	周年	周年	-	-							
射水市	2.0	100	春のセンバツ		周年	周年	-	-	並	並	生育はおおむね良好			
なつき	見込み													
えだまめ	普通	射水市	37.0 見込み	105	たんくろう	100	3/26		-	-	並	やや不良	5月の日照不足	3月下旬は種は、7月初旬 から収穫が始まっている。 昨年より全体的に草丈が 10cm程度低い。
(3/26)	(8/4)													
トマト	半促成	魚津市	0.5	100	アニモTY-12	100	1/3		3/15	3/26	並	不良		8段目着果肥大。生育はお おむね良好。
		(1/上)	(3/10)	(3/30)										
		富山市 (富山)	1.3	72	桃太郎ワンダー	80	1/11	1/15	3/20		並	並		6段目収穫中
その他	20	(1/7)	(1/30)	(3/20)	(4/1)									
南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイト	60	苗購入		2/11	2/12	並	並		9~10段目収穫中 7/5で収穫打ち止め		
CFハウス桃太郎	30	()	()	()	()									
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.8	93	兼備2号	36	1/下		3/2	4/12	やや遅い	並		加温は収穫終了、無加温収 穫終盤
ニーナ	21	(1/下)	(2/25)	(4/12)										
なす	露地	上市	0.3	100			購入苗		4/30	5/10	並	並		5月上旬定植で、草丈 100cm、収穫中
		(4/26)	(5/6)											
高岡市	0.3	100	千両2号	100	3/上		4/27	5/10	並	並		害虫はみられない。生育は おおむね良好		
(1/15)	(1/25)	(4/25)	(5/5)											
すいか	トンネル早熟	入善町	3.7	90	入善ジャンボ	100	4/2	4/10	4/26	5/5	1週間程度遅い	並	定植後の低温	肥大も1週間程度遅れてお り、積算温度では7月24日 頃から出荷開始となる見込 み。
(3/25)	(4/18)	(4/23)	(5/3)											
加工用キャベツ	春まき	小矢部市 (福岡含 む)	9.4	138	おきなSP	62	2/24	3/10	4/1		並	やや不良	黒すす病	株太りが悪く、黒すす病で減 収。「おきなSP」で病害目立 つ。
初恋	38	(2/20)	(3/12)	(4/8)	(4/24)									
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー	75					並		一季どりは株養成中。立茎 栽培は6月下旬から収穫開 始	
ウインデル	20	()	()	()	()									
だいこん	トンネル	魚津市	4.4	107	晩々G	40	3/31	5/15			やや遅い	並	収穫終期。4月下旬は種の ほ場で抽たいが発生した。 収穫時の割れが多い。	
晩抽春のいぶき	40													

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
にんじん	春まき	富山市 (あおぼ全域)	0.3	150	綾誉 紅ひなた	40 60	3/20 (3/4)	3/24 (4/10)	()	()	並	並		7/5,6収穫	
		高岡市	0.3	100	紅うらら	100	4/2 (4/12)	4/10	—	—	並	並		根重180g 7/5より機械収穫。奇形は少ない。	
		砺波市	0.4	133	紅ひなた	100	3/19 ()	3/25 ()			早い 6/25より収穫開始	並	不織布のべたがけによる生育促進	【5株平均】 (本年)根径49mm、肥大根長20cm、草丈74cm、葉重105g、根重197g (前年)根径44mm、肥大根長19cm、草丈62cm、葉重59g、根重161g程度	
	夏まき	富山市 (あおぼ全域)	1.4	107	愛紅 彩誉	70 20	7/20予定 (7/20)							7/20頃よりは種の予定	
		高岡市	9.5	100	愛紅 紅ひなた		()	()						7/20頃よりは種の予定	
		砺波市 南砺市			愛紅 紅ひなた		()	()						7/15~20頃よりは種の予定	
		南砺市 (福光)	6.5	203	愛紅 紅ひなた		()	()						7/20頃よりは種の予定	
さといも	普通	入善・朝日	3.6	90	大和	100			4/7 (4/5)	6/上	並	並		葉数5~6枚、草丈40cm	
		上市町 見込み	10.7	100	大和	100			4/5 (4/9)	6/2 (6/5)	並	並		4月上旬定植で葉齢8枚目展開中	
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/6 (4/15)	5/中 (5/25)	並	並		本葉4葉展開、草丈40cm 一部で湿害により苗立減少	
		小矢部 (福岡含む)	3.4	100	大和	100			4/20 (4/24)	4/22 (4/25)	並	並		本葉4~6葉展開 草丈40~60cm	
		砺波市	1.2	44	大和	95				5/8		やや遅い	並	5月の降雨後に植付けほ場では植付け条件が悪くやや生育が遅れている。	生葉数5枚 草丈30~40cm(前年比-10cm)
		南砺市 (福野)	11.8	99	石川早生 大和	40 50			4/下 5/上	5/下	並~ やや早い	並	5月の降雨前に植付けほ場では生育早い。	早生は生葉数5~6枚、草丈60~70cm(前年比同等) 大和は生葉数4~5枚、草丈45cm(前年比-5cm)	
		南砺市 (井波)	11	100	大和	90				5/5頃		並~ やや早い	並	5月の降雨前に植付けほ場では生育早い	生葉数4枚、草丈30cm(前年比同等)
ばれいしょ	春植え	富山市 (なのはな、富山)	8.3	128	男爵 とうや	47 53			3/9 (3/19)	4/8 (4/18)	並	並		収穫中。風乾の徹底により、収穫後の腐敗は今のところみられない。	
		射水市	0.7	100	とうや	100			3/26 (3/24)	3/27 (4上)	並	並		6/30~7/3に収穫された	
		高岡市	1.0	32	とうや オホーツクチップ	47 32			3/20 (3/19)	4/3 (4/8)	並	並		「とうや」の一部で割れが発生	
たまねぎ	秋まき	砺波市 南砺市	152	87	ターザン スタリオン	85 15	8/25	9/7	10/14	11上	並	並	収穫開始から天候に恵まれ順調に掘り上げされている。	7/5現在で未収穫面積10~15ha程度	