



品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.6 (見込み)	100	黄楽70 あきめき	50 30	8/5		8/25	9/中 (8/28)	9/16	並	並		8月下旬定植で結球中期、 生育は平年並である。
		高岡市	0.5	100	黄ごころ65 きらぼし70	60 20	8/5 (8/3)	8/下 (8/28)	8/27 (8/25)	9/20 (9/17)	並	並			結球始め、生育は順調
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.5)	(100)	おはよう サマードーム	(50) (30)	7/13 (7/15)	8/10 (8/6)	8/22 (8/6)	9/4 (9/4)	並	並	8月上旬の降雨により、定植 が遅れた。	追肥により、生育むらはお おむね解消されたが、生育 はやや遅れている。	
		南砺市 (福光)	1	100	おはよう	100	7/18	7/26	8/14	9/12	並	やや不良	8月の高温乾燥及び多雨	8/14定植では10/中旬から 収穫予定	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3 <small>※収穫可能なほ場のみ</small>	100	グリーンタワー ウィンデル	75 20	( )	( )	( )	( )	並	並	8月の高温乾燥及び多雨	春どり及び長期どり栽培で 草丈2m以上、1年株養成 春一期どり栽培で草丈 180cm程度	
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	18.7 (見込み)	109	夏の翼 秋の翼	40 30	7/30 (7/31)	9/22 (9/21)	-	-	やや遅い	並	8月中旬以降の日照不足	生育は昨年より数日遅い。 横縞症が多く、空洞症が極 少発生	
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100	CRもちばな		8/19 (8/21)	( )			並	並		8/19は種で根径約8~ 10cm	
大かぶ	露地 夏まき 秋冬どり	富山市 (婦中)	6.9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/16 (8/27)	8/20頃 (9/6)			並	並		根部はテニスボール程度に 肥大	
		高岡市	6.8	100	早生大かぶ 京千舞	20 80	8/29 (8/20)	9/10 (9/10)			並	並		8/29は種で、かぶの直径が 6cm	
		南砺市 (福光)	3.0	100	早生大かぶ	100	8/23	9/中	( )	( )	並	並		8/25は種で直径5cm程度	
にんじん	夏まき	富山市 (あおば全域)	1.4	107	愛紅 綾誉	70 20	7/21 (7/20)	8/30 (8/15)	( )	( )	並	やや不良	は種期の高温、は種後の降 雨により発芽率低下(株立率 管内平均60%)	8月上旬は種で出葉数8.8 枚、根重20g	
		高岡市	9.5	100	愛紅 紅ひなた		7/26 (7/19)	8/30 (8/31)			並	並		生育はおおむね順調であ る。ロロックスの散布により 雑草が少なくなっている。	
		砺波市 南砺市	12.6	79	紅ひなた 愛紅	45 35	7/25 ( )	( )	( )	( )	やや遅い	やや不良	7月下旬~8月の高温乾燥 及び多雨	7/25は種「紅ひなた」で根 重40g(昨年:7/21は種で根 重60g)と生育が遅れてい る。	
		南砺市 (福光)	8.9	148	愛紅 紅ひなた	57 43	7/21 ( )	8/下 ( )	( )	( )	やや遅い	やや不良	7月下旬~8月の高温乾燥 及び多雨	7/20は種で根重50g、早播 きで湿害による腐敗発生、 10月下旬から収穫開始予 定	
さといも	普通	入善・朝日	3.6	100	大和	100			4/上 (4/7)		並	並		草丈100~120cm、葉数3枚 程度、一部で個販用の収穫 が始まっている。	
		上市町 (見込み)	10.0	100	大和	100			4/5 (4/5)	6/2 (6/2)	並	並	いも肥大期の8、9月の適度 な降水による	4月上旬定植で収穫期を迎 え葉色が退色中、大玉傾向	
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/4 (4/6)	5/9 (5/15)	並	並		収穫始め、いもの肥大は良 好	
		小矢部 (福岡含む)	4.2	124	大和	100			4/1 (4/10)	5/8 (4/20)	並	並		葉数4~6展開、草丈120~ 140cm	
		砺波市	1.2	100	大和	95			5/6		並	並	定期的な降雨	いもの肥大は良好	
		南砺市 (福野)	12.1	103	石川早生 大和	30 70			4/下 5/上	5/下	並~やや良	並	定期的な降雨	収穫中	
		南砺市 (井波)	9.9	90	大和	90			4/20頃		並	並	定期的な降雨	葉柄長120cm程度	
たまねぎ	露地普通	富山市 (JAなのはな)	4 (見込み)	222	ターザン	100	9/1 ( )	( )	(10/27)	(10/30)	並	並		本葉2~3枚目展開中、か ん水むら・剪葉のし過ぎに より、一部で生育不良	
		滑川市、上市町 (JAアルプス)	1.5 (見込み)	150	ターザン もみじ3号	80 20	9/1 ( )	( )	(10/22)	(10/30)	並	並		本葉3枚目展開中	
		砺波市 南砺市	140	103	ターザン もみじ3号	95 5	8/26		10/中	11/上		並	昨年より暑い気候(台風11号 通過前後で一部生産者で苗 枯死)	発芽率98.3%(前年99.2%) 苗立率96.5%(前年98.1%)	
にんにく	露地普通	南砺市 (城端)	2.3 (見込み)	121	上海早生 嘉定	90 10			9/24 (9/29)	10/9 (見込み) (10/30)	例年どおりに 植付け開始	並		9/24から植付けが開始さ れ、10/9に終了予定	