

## 野菜生育情報(11月9日現在)

※播種期・定植期の下段の( )の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 夏秋・ 秋冬どり	黒部市	13.0	103	夏扇4号	45	1/17	5/上	3/30	6/中	並	並		一部で生育遅延ぎみのほ場・うねがあるが、全体としては順調に生育、収穫している。最終土寄せはほぼ終了
					夏山一本太	32	(11/1)	(5/上)	(3/25)	(6/上)				
		富山市 八ヶ山 (見込み)	1.5	100	項羽一本太	60	2/3	4/5	4/6	5/下	並	やや不良	軟腐病発生	収穫終期、5月上旬定植で草丈95~100cm、生葉数6~7枚
					夏扇4号	25	(2/10)	(4/10)	(4/20)	(5/30)				
		中央 (見込み)	6.2	100	夏扇4号	85	2/上	4/13	3/下	6/9	並	やや不良	軟腐病発生	5月中旬定植で草丈90~95cm、生葉数6~7枚
					源翠	10	(1/11)	(5/上)	(3/19)	(6/9)				
	富山市 (大沢野)	1.8	92	夏扇4号	40	2/19	4/20	4/13	5/31	並	並		6月定植で草丈95~100cm、生葉数5~6枚	
				夏扇パワー	30	(1/30)	(3/30)	(4/6)	(6/7)					
	富山市 (大山) 立山町	1.3	130	夏扇4号	70	2/28	3/4	4/6	4/12	並	並		6月定植で草丈70cm、生葉数6.1枚	
				夏山一本太	30	(2/22)	(3/26)	(4/6)	(4/12)					
	春まき 秋冬どり	射水市	3.8	100	関羽一本太	(30)	2/20	4/10	4/15	6/13	並	並		草丈70~80cm程度となっている。
					ホワイトスター	(30)	(2/20)	(4/10)	(4/15)	(5/29)				
氷見市		3.0	120	秋の宝山	40	2/1	3/25	4/20	5/10	並	並		草丈70~80cm、葉鞘径15~20mm、やや葉鞘径が細い傾向がある。	
				ホワイトソート	20	(2/1)	(3/20)	(4/10)	(5/11)					
砺波市		4.5	90	関羽	95	1/11	( )	3/29	3/30	並	やや良	天候に合わせた栽培管理(土寄せ等)	収穫中	
				(1/11)	( )	( )	( )							
南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター	90	1/下	4/下	4/1	( )	並	やや不良	排水不良	定点の調査ほ場は収穫済み(参考)他ほ場:草丈55~60cm、生葉数6~7枚、湿害により生育停滞		
			源翠・夏山一本太	10	(1/下)	(4/下)	(4/1)	(5/中)						
青ねぎ	周年	富山市 (富山) (見込み)	(見込み)	緑秀		周年				並	並		8月下旬定植の青ねぎは収穫終期、ハウス栽培の青ねぎは草丈15~30cm	
ほうれんそう	周年	富山市 (富山) (見込み)	3.0 (見込み)	福兵衛		周年				並	並		10月中旬は種で、本葉6枚目、草丈約10cm	
				スーパーヴィジョン										
		高岡市	1.0	100	ゴードン	30	周年	周年	-	-	並	並		生育はおおむね順調である。
					ハンター	20								
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	浜つづき	100	周年				並	並		生育はおおむね順調で揃っている。
		富山市 (JAなのはな) (見込み)	5.8 (見込み)	100	さくらぎ 冬里		周年				並	並		生育はおおむね順調
		富山市 (八尾)	2.2	100	冬里	100	周年				並	並		生育はおおむね良好
		射水市	2.0	100	冬里	(40)	周年	周年	-	-	並	並		生育はおおむね順調である。
きゅうり	抑制	富山市 (八ヶ山)	0.4 (見込み)	63	兼備2号 T178	33 38			7/中 (8/5)	8/9 (8/22)	並	並		収穫終期
		富山市 (南部施設) (見込み)	0.1 (見込み)	100	兼備2号	80	購入苗					並	並	
なす	露地	上市町	0.2	100	千両2号	100	購入苗		4/27 (4/26)	5/7 (5/6)	並	並		収穫終了
キャベツ	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.3)		初恋		7/15 (7/12)	8/10	8/7 (8/6)	9/4	並	並		8月中旬定植は収穫終了し、下旬定植を収穫中である。9月中旬に定植した「冬みつ」は球径10cm程度になっている。
加工用キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.3	140	おきなSP	100	7/15 (7/12)	7/28 (7/27)	8/5 (7/30)	8/23 (8/20)	並	やや不良	排水不良による湿害の発生	8月5日定植ほ場の収穫は終了した。小玉傾向で生食用ほ場から不足を補っている。
		富山市 (JAなのはな)	2.9	73	おきなSP 輝吉	36 33	7/13 (7/20)	(7/30)	8/6 (8/11)	8/31 (8/31)	並	並		8月中旬定植で球重約1.8kg
		小矢部市 (福岡含む)	18.0	103	おきな 恋唄(THY105)	51 22	7/5 (7/5)	(8/6)	7/29 (7/31)	9/20 (9/15)	並	やや不良	8月3~4半旬の降雨による湿害(欠株)の発生	8月中旬までに定植したほ場では、収穫を開始している。8月下旬定植ほ場では順調に肥大している。
		南砺市 (福光)	0.96	157	輝吉 おきな	60 40	7/9	7/下	8/1	8/23	並	並	8月の高温乾燥及び多雨	10/24~随時出荷中
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市 (見込み)	1.6 (見込み)	100	黄楽70 あきめき	50 30	8/5		8/25 (8/28)	9/中 (9/16)	並	並		順調に生育しているが、平年に比べてやや小玉傾向である。
		高岡市	0.5	100	黄ごころ65 きらぼし70	60 20	8/5 (8/3)	8/下 (8/28)	8/27 (8/25)	9/20 (9/17)	並	並		収穫始期を迎えている。
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.5)	(100)	おはよう サマードーム	(50) (30)	7/13 (7/15)	8/10 (8/6)	8/22 (8/6)	9/4 (9/4)	並	並		8月中旬定植は収穫終了し、下旬定植を収穫中である。9月上旬定植では、出蕾期となっている。
		南砺市 (福光)	1	100	おはよう	100	7/18	7/26	8/14	9/12	並	やや不良	8月の高温乾燥及び多雨	8月下旬定植では10月上旬に発蕾し、随時収穫中

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウィンデル	75 20	( )	( )	( )	( )	並	並	8月の高温乾燥及び多雨	春どり・長期どり栽培は草丈2m以上、1年株養成春一期どり栽培は草丈180cm程度、10月中旬で出荷終了
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	18.7 (見込み)	109	夏の翼 秋の翼	40 30	7/30 (7/31)	9/22 (9/21)	-	-	やや遅い	並	10月の気温が平年より低い	例年より生育が遅く、ほ場によってはMなどの例年より小さい規格が多い場合もある。
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100	CRもちばな		8/19 (8/21)	( )			並	並		9月中旬は種で球径約5cm
大かぶ	露地 夏まき 秋冬どり	富山市 (婦中)	6.9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/16 (8/27)	9/20 (9/6)			並	並		最大葉長50cm、根径20cm
		高岡市	6.8	100	早生大かぶ 京千舞	20 80	8/29 (8/20)	9/10 (9/10)			並	並		8月29日は種で、かぶの直径は15cm程度になっている。
		南砺市 (福光)	3.0	100	早生大かぶ	100	8/23	9/中	( )	( )	並	並		LMサイズ中心に随時収穫中
にんじん	夏まき	富山市 (あおば全域)	1.4	107	愛紅 綾誉	70 20	7/21 (7/20)	8/30 (8/15)	( )	( )	並	やや不良	は種期の高温、は種後の降雨により発芽率低下(株立ち率管内平均60%)	8月上旬は種で出葉数11枚、根重140g
		高岡市	9.5	100	愛紅 紅ひなた		7/26 (7/19)	8/30 (8/31)			並	並		掘取りが始まっている。一部でうねが低くなり、湿害によるこぶ症状、短根が発生している。
		砺波市 南砺市	12.6	79	紅ひなた 愛紅	45 35	7/25 ( )	( )	( )	( )	現在40%程度 収穫終了	やや不良	7月下旬～8月の高温乾燥及び多雨	7月下旬は種で10/20から収穫開始
		南砺市 (福光)	8.9	148	愛紅 紅ひなた	57 43	7/21 ( )	8/下 ( )	( )	( )	並	やや不良	7月下旬～8月の高温乾燥及び多雨	7月下旬まで10/25～収穫開始、8月上旬播きで11/14～収穫開始予定
さといも	普通	入善・朝日	3.6	100	大和	100			4/上 (4/7)		並	並		いもの肥大は平年並、天候がよく計画どおり収穫が行われている。
		上市町 (見込み)	10.0	100	大和	100			4/5 (4/5)	6/2 (6/2)	並	並	いも肥大期の8、9月の適度な降水による	収穫期を迎え葉色が退色中、大玉傾向
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/4 (4/6)	5/9 (5/15)	並	やや良		いもの肥大は良好である。
		小矢部 (福岡含む)	4.2	124	大和	100			4/1 (4/10)	5/8 (4/20)	並	並		現在収穫中、いもの肥大は平年並である。
		砺波市	1.2	100	大和	95			5/6		並	やや良	9月までの高温と定期的な降雨	10/14から収穫開始 やや増収
		南砺市 (福野)	12.1	103	石川早生 大和	30 70			4/下 5/上	5/下	並	並 やや良	9月までの高温と定期的な降雨	早生:9月末出荷終了 大和:いもの肥大良
		南砺市 (井波)	9.9	90	大和	90			4/20頃		並	やや良	9月までの高温と定期的な降雨	10/上から収穫開始 いもの肥大良
たまねぎ	露地普通	富山市 (JAなのはな)	5	300	ターザン	100	9/1 ( )	( )	10/26 (10/27)	11/3 (10/30)	並	並		生葉数2～3枚
		滑川市、上市町 (JAアルプス)	1.5 (見込み)	150	ターザン もみじ3号	80 20	9/1 ( )	( )	10/22 (10/22)	10/31 (10/30)	並	並		本葉5枚目展開中
		砺波市 南砺市	140	103	ターザン もみじ3号	95 5	8/26		10/中	11/上	11/8でほぼ定 植終了(残り1 筆)。	並	定植時期が比較的晴れが多かった。	
にんにく	露地普通	南砺市 (城端)	2.2	115	上海早生 嘉定	96 4			9/24 (9/25)	10/9 (10/30)	やや早い	並	早植え(9/24～) 10月上旬の降雨	生葉数6～7枚程度