

富山県加工業務用野菜等供給拡大推進協議会

【事務局】 富山県農林水産部 農業技術課 広域普及指導センター
TEL 076-429-5041 FAX 076-429-5049

野菜生育情報(令和4年4月6日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	(3.2)	(100)	吉晴 春川	60 39	4/20 (4/20)	5/20 (5/25)	6/15 (6/16)	6/25 (6/26)	並	並	1~2月の雪と3月上旬の低温	一部で欠株がみられる。抽たいはしていないものの葉身の中で花茎が10cm程度に伸長
		氷見市	1.0	83	羽緑一本太 吉晴	70 30	4/1 (4/15)	4/25 (4/25)	6/10 (6/5)	6/20 (6/20)	10日程度遅い	並	1~2月の雪と3月上旬の低温	雪による葉の損傷が多く、新葉の展開が遅れている。一部で欠株がみられる。
	秋まき 初夏どり	氷見市	0.6	150	羽緑一本太	100	9/3 (9/10)	9/20 (9/15)	10/20 (10/24)	11/3 (11/4)	10日程度遅い	並	1~2月の雪と3月上旬の低温	生育は遅く、定植時期による生育差が大きい(草丈10~40cm、葉鞘径6~12mm)。
	春まき 秋冬どり	黒部市	0.4		夏扇パワー	100	11/7 (11/4)		3/25 (3/19)		並	並		活着はほぼ順調。草丈約30cm、生葉数約2.0枚、太さ約4.3mm
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	100	項羽一本太(THN160) 夏扇4号	60 25	2/3 (2/10)	(4/10)	4/上 (4/20)	(5/30)	並	並		苗の生育はおおむね良好 4/6頃より定植予定
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 源翠	85 10	1月 (1/11)	(5/上)	3/下 (3/19)	(6/9)	並	並		苗の生育はおおむね良好 3月下旬より順次定植予定
		富山市 (大沢野)	2.0 (見込み)	55	夏扇4号 夏扇パワー	40 30	2/19 (2/28)	(3/4)	(4/6)	(5/8)	並	並		一部湿害により葉先枯れ
	春まき 夏秋どり	富山市 (大山)	0.6 (見込み)	100	夏扇4号 夏山一本太	70 30	2/28 (2/22)	3/4 (3/4)	(4/6)	(4/29)	並	並		苗の生育はおおむね良好 草丈5~6cm程度
	春まき 夏秋・秋冬どり	立山町	10.0 (見込み)	90	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	12/25 (1/5)	(4/10)	3/28 (3/24)	(5/20)	並	並		草丈12cm 活着は順調
	春まき 夏秋どり	射水市	(3.1)	(100)	夏扇パワー 源翠	(30) (20)	1/10 (1/10)	3/1 (3/1)	3/25 (3/25)	(4/25)	並	並		育苗順調
		氷見市	(3.0)	(100)	夏山一本太 龍美	(40) (24)	1/7 (1/10)	3/1 (2/1)	3/10 (3/10)	(4/5)	並	並		定植後の生育は順調
	春まき 秋冬どり	射水市	(3.8)	(100)	関羽一本太 ホワイトスター	(30) (30)	2/20 (2/20)	(4/10)	(4/15)	(5/29)	並	並		育苗順調
		氷見市	(3.0)	(120)	秋の宝山 ホワイトソート	40 20	2/1 (2/1)	(3/20)	(4/10)	(5/11)	並	並		育苗順調
	春まき 夏秋どり	砺波市	4.5	90	関羽	95	1/11 (1/11)	()	3/29 ()	3/30 ()	並	並		順次定植作業が実施
南砺市 (城端)		1	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	1/下 (1/下)	()	4/1 ()	()	並	並		定植未実施	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	0.6 (見込み)	55	越中なつ小町 越中ふゆ小町	72 28	1/17 (1/22)	(3/30)	3/25 (3/25)	(5/上)	並	並		苗は順調に発芽、生育中、定植後の活着はほぼ順調、草丈約20cm、生葉数約1.8枚(1/17は種、3/25定植、なつ小町)
		魚津市	0.7 (見込み)	64	越中なつ小町 越中ふゆ小町	60 40	1/17 (1/10)	1/20 (1/23)	4/2 (3/25)	(4/21)	並	並		3月下旬の降雨のため昨年より定植が遅れた。定植時の苗で生葉数1.8枚
青ねぎ	周年	富山市 (富山)	(見込み)		緑秀			周年		並	並		1月中旬は種分は3月下旬から定植開始2葉、草丈10cm	
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3.0 (見込み)	100	福兵衛			周年		並	並		3月は種で本葉2葉期	
	周年	高岡市	11.0	100	ハンター ジャスティス	40 30	-	-	-	-	並	並		露地春まきは3/10からは種されている。露地・施設共、生育順調
こまつな	周年	魚津市	0.27 (見込み)	90	春のセンバツ なつき	50 50					やや早い	並	3月中下旬の気温が高かったため	強風で2棟のハウスの被覆物が破損し、栽培ができない状態である。生育は平年よりやや早く、一週間程度早く収穫している。
	周年	富山市 (JAなのはな)	5.8 (見込み)	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育はおおむね良好
	周年	富山市 (八尾)	2.2	100	春のセンバツ さくらぎ	60 30	周年				やや早い	並	気温の上昇により一部収穫遅れ。廃棄や直売所で販売	生育はおおむね良好
	周年	射水市	2.0	100	(冬里)	(40)	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ	露地	射水市	(37.0)□	(100)	たんくろう	100	3/25 (3/20)	(7/30)	-	-				まだ発芽はみられない。
トマト	半促成	魚津市	0.5	100	アノモTY-12	100	購入苗 (1/3)		3/中 (3/15)	3/下 (3/26)	並	並		1~2段花房が開花中。本年よりすべての生産者が購入苗を使用している。
		富山市 (富山)	1.0	80	桃太郎ワンダー 麗月	50 30	1/11 (1/11)	1/17 (1/15)	3/16 (3/20)	(4/2)	並	並		1段目開花~2段目蕾
		南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	60 30	苗購入 () ()		2/20 (2/11)	2/21 (2/12)	並	並		3段目開花、3段目トーン処理済み、1段目順調に肥大
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.7 (見込み)	90	兼備2号 ニーナ	23 18	1/19 (1/下)		2/28 (2/25)		やや遅い	並	灯油高騰で管理温度を低くしているため	早い定植で草丈1.3m、収穫始め、無加温は定植中
すいか	トンネル早熟	入善町	3.3 (見込み)	89	入善ジャンボ	100	4/2 (4/2)				並	並		発芽始め

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	2.5	100	極早生732号 中早生3号	40 30	9/20 (9/20)	10/10 (10/10)	10/20 (10/21)	11/12 (11/12)	並	並		極早生732号では結球が始まっている(平年並)。
加工用キャベツ	春まき 初夏どり	小矢部市 (福岡含)	8.3	88	初恋 THY-150	41 37	2/20 (2/24)	3/7 (3/10)	4/3 (4/3)		並~やや早い	並		苗の本葉2.5~3枚展開し、定植が始まっている(平年並)。
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウィンデル	75 20	() ()	() ()	() ()	() ()	遅い	並	融雪日が近年で最も遅い3/5となった。	・露地は4月中旬 ・ハウスは3/30より収穫・出荷(1日20束程度)
だいこん	トンネル	魚津市	5.0 (見込み)	100	晩々G 夏つかさ旬	40 40	4/2 (3/30)		-	-	並	並		4/2は種のほ場で未発芽。は種、トンネル等順調に作業が行われている。
	トンネル マルチ	氷見市	0.8	100	晩抽春のいぶき 天竺	90 10	3/4 (2/25)	3/24 (3/20)	-	-	7日程度遅い	並	2月の低温により、は種が遅れた。	本葉1~3枚と平年よりも遅れている。
にんじん	春まき	富山市 (あおぼ全域)	0.6	200	紅ひなた 彩誉	50 50	3/17 (3/20)	3/24 (3/24)	() ()	() ()	並	並		発芽はみられない。
		高岡市	0.3	100	紅うらら	100	(4/12)		-	-				4月第3週には種予定
		砺波市	0.4	100	紅ひなた	100	3/25 () ()	3/30 () ()			並	並		不織布のべたがけを実施(べたがけは4月1日に実施)しているが、発芽は未確認(4月4日現在)
たまねぎ	露地普通	富山市 (JAなのはな)	1.8	106	ターザン	100	() ()	() ()	10/27 () ()	10/30 () ()	並	並		草丈22~30cm、生葉数3~4枚
		滑川市、上市町 (JAアルプス)	1	100	ターザン もみじ3号	90 10	() ()	() ()	10/22 () ()	10/30 () ()	並	並		草丈22~25cm、生葉数3~4枚、上市町は暴風の影響で葉折れ発生、現在回復中
		砺波市	136	89	ターザン	95	8/27		10/14	11上	やや遅い	並	・融雪日が近年で最も遅い3月5日となった。 ・3月26日に最大瞬間風速25m/s超の強風	融雪後、大豆後圃場にて株消失が目立つ(ただし、産地全体での株消失は0.1%未満)。強風後は緊急防除(バリダシ)にて対応済
		南砺市			もみじ3号	5								
にんにく	露地普通	南砺市 (城端)	1.7	100	上海早生 嘉定	95 5	() ()	() ()	9/29 () ()	11/1 () ()	やや遅い	並	・大雪による損傷あり ・3/18でも一部ほ場で積雪あり ・3/26に最大瞬間風速25m/s超の強風	年内生育は良好だったが、大雪の影響で茎葉が損傷、その後、3/26の強風により起き上がった地上部が激しく損傷(草丈10cm程度)、雪解け後(カスミンボルドー)、風被害後(バリダシ液剤5)散布済み
ばれいしょ	春植え	富山市 (なのはな、富山) (見込み)	6.5	77	男爵 とうや	70 30			3/12 (3/17)	(4/8)	並	やや不良	種芋産地の不作により種芋の質悪く、サイズ不ぞろい。	現在植付け中
		射水市	0.7	100	とうや	100	-	-	3/30 (3/26)	(3/27)	並	並		覆土量はおおむね10cm程度と適正な覆土量となっている。
		高岡市	0.7	70	とうや 男爵	60 22	-	-	3/26 (3/20)	(4/3)	並	並		覆土量は10~12cmと適正な覆土量であり、うね高22cm

※()は前年実績