

野菜生育情報(8月9日現在)

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | は種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 |
| 白ねぎ | 秋まき 初夏どり | 黒部市 | 0.4 | | 夏扇パワー | 100 | 11/7 (11/4) | | 3/25 (3/19) | | 並 | 並 | | 7月出荷ねぎは順調に出荷 中で、残り10a程度 |
| | | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 黒部市 | 13.0 (見込み) | 103 | 夏扇4号 夏山一本太 | 45 32 | 1/17 (11/1) | 5/上 (5/上) | 3/30 (3/25) | 6/中 (6/上) | 並 | 並 | |
| | 富山市 ハケ山 | | 1.5 (見込み) | 100 | 項羽一本太 夏扇4号 | 60 25 | 2/3 (2/10) | 4/5 (4/10) | 4/6 (4/20) | 5/下 (5/30) | 並 | 並 | | 4月上旬定植で草丈75~ 80cm、生葉数5~6枚 |
| | 中央 | | 6.2 (見込み) | 100 | 夏扇4号 源翠 | 85 10 | 2/上 (1/11) | 4/13 (5/上) | 3/下 (3/19) | 6/9 (6/9) | 並 | 並 | | 4月中旬定植で草丈90~ 95cm、生葉数7~8枚 |
| | 富山市 (大沢野) | | 2.0 (見込み) | 100 | 夏扇4号 夏扇パワー | 40 30 | 2/19 (1/30) | 4/20 (3/30) | 4/13 (4/6) | 5/31 (6/7) | 並 | 並 | | 4月中旬定植で草丈65cm、 生葉数6.2枚 |
| | 富山市 (大山) | | 0.6 (見込み) | 100 | 夏扇4号 夏山一本太 | 70 30 | 2/28 (2/22) | 3/4 (3/26) | 4/6 (4/6) | 4/12 (4/12) | 並 | 並 | | 4月上旬定植で草丈72~75 cm 生葉数6.1枚 |
| | 立山町 | | 10.0 (見込み) | 90 | 夏扇パワー 夏扇4号 | 15 70 | 12/25 (1/5) | 4/11 (4/10) | 3/28 (3/24) | 6/4 (5/20) | 並 | 並 | | 3月下旬定植で葉鞘長 32cm、草丈100cm程度 |
| | 春まき 夏秋どり | | 射水市 | 3.1 | 100 | 夏扇パワー 源翠 | (30) (20) | 1/10 (1/10) | 3/1 (3/1) | 3/25 (3/25) | 4/25 (4/25) | 並 | 並 | 7月6半旬以降の高温 |
| | | 氷見市 | 3.0 | 100 | 夏山一本太 龍美 | (40) (24) | 1/7 (1/10) | 3/1 (2/1) | 3/10 (3/10) | 4/20 (4/5) | やや遅い | 並 | 7月6半旬以降の高温 | 草丈80cm程度、葉鞘径14 ~20mmでやや細く、葉先枯 れなど生育は停滞している。 |
| | 春まき 秋冬どり | 射水市 | 3.8 | 100 | 関羽一本太 ホワイトスター | (30) (30) | 2/20 (2/20) | 4/10 (4/10) | 4/15 (4/15) | (5/29) | 並 | 並 | 7月6半旬以降の高温 | 草丈50cm程度と生育が停 滞している。一部ほ場で雑 草が繁茂している。 |
| | | 氷見市 | 3.0 | 120 | 秋の宝山 ホワイトソート | 40 20 | 2/1 (2/1) | 3/25 (3/20) | 4/20 (4/10) | 5/10 (5/11) | 並 | 並 | 7月6半旬以降の高温 | 草丈40~60cm、葉鞘径10 ~15mm、7月下旬の乾燥 により生育が停滞してい る。 |
| | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 砺波市 | 4.5 | 90 | 関羽 | 95 | 1/11 (1/11) | () | 3/29 () | 3/30 () | 並 | 並 | 空梅雨(高温乾燥) ⇒戻り梅雨⇒高温 乾燥 | 天候に合わせた栽培管理 (土寄せ等)により、生育自 体は良好であるが、出荷時 期は例年比やや遅くなる見 込み。草丈80~85cm、生葉 数5~6枚程度、残存株率 は高い。 |
| | | 南砺市 (城端) | 1 | 100 | ホワイトスター 源翠・夏山一本太 | 90 10 | 1/下 (1/下) | () | (4/1) | () | 並 | 並 | 高温乾燥 | 草丈85cm、生葉数7枚程 度、軟白長27cm確保 |
| 短葉性ねぎ | 春まき 夏秋どり | 黒部市 | 0.6 (見込み) | 55 | 越中なつ小町 越中ふゆ小町 | 72 28 | 1/17 (1/22) | 4/上 (3/30) | 3/25 (3/25) | 5/中 (5/上) | 並 | 並 | | 「ふゆ小町」を収穫中、伸 び、太りとも平年並、残り 30a程度 |
| | | 魚津市 | 0.7 | 64 | 越中なつ小町 越中ふゆ小町 | 60 40 | 1/17 (1/10) | (1/23) | 4/2 (3/25) | 4/9 (4/21) | 並 | 並 | | 収穫終了 |
| 青ねぎ | 周年 | 富山市 (富山) | (見込み) | | 緑秀 | | 周年 | | | 並 | 並 | | 4月上旬には種した青ねぎ ほ場で収穫開始、草丈は 55cm程度 | |
| ほうれんそう | 周年 | 富山市 (富山) | 3.0 (見込み) | 100 | ジャスティス | | 周年 | | | | 並 | 並 | | 7月中旬は種で本葉5~6 枚 |
| | | 高岡市 | 11.0 | 100 | ジャスティス ミラージュ | 60 20 | 周年 | 周年 | - | - | やや遅い | やや不良 | 7月6半旬以降の高温 | 高温の影響で生育が停止 し、葉先枯れが発生してい る。 |
| こまつな | 周年 | 魚津市 | 0.3 | 100 | なつき | 100 | 周年 | | | | 並 | 並 | | 生育は順調だが、一部のハ ウスで雑草(主にスペリヒ ユ)が多い。また、7月下旬 から高温障害と考えられる 外葉の淡緑化がみられる。 |
| | | 富山市 (JAなのほな) | 5.8 (見込み) | 100 | 春のセンバツ | 100 | 周年 | | | | 並 | 並 | | 生育はおおむね順調 |
| | | 富山市 (八尾) | 2.2 | 100 | 春のセンバツ さくらぎ | 60 30 | 周年 | | | | 並 | 並 | | 生育はおおむね良好 |
| | | 射水市 | 2.0 | 100 | なつき | (40) | 周年 | 周年 | - | - | 並 | 並 | | 生育順調 |
| えだまめ | | 射水市 | 37.0□ | 100 | たんくろう | 100 | 3/25 (3/20) | | - | - | 並 | 並 | 7月3半旬~5半旬 の寡日照 | 5月中旬は種まで収穫され ている。子実の肥大が遅く、 1週間程度予定より収穫が 遅延している。生育量は、 ほ場による差が大きい。 |
| きゅうり | 抑制 | 入善・朝日 | 0.6 (見込み) | 100 | 兼備2号 | 90 | 7/上 (7/上) | | 7/下 (7/下) | 8/上 (8/上) | 並 | 並 | | 高温により苗の萎れがみら れる。 |
| | | 富山市 (ハケ山) | 0.4 (見込み) | 63 | 兼備2号 T178 | 33 38 | | | 7/中 (8/5) | 8/9 (8/22) | 並 | 並 | | 生育はおおむね順調、7月 中旬定植の株で草丈約 160cm |
| | | 富山市 (南部施設) | 0.1 (見込み) | 100 | 兼備2号 | 80 | 購入苗 | | | | 並 | 並 | | 定植準備中 |
| なす | 露地 | 上市町 | 0.2 | 100 | 千両2号 | 100 | 購入苗 | | 4/27 (4/26) | 5/7 (5/6) | 並 | 並 | | 主枝の収穫終了、側枝部 分の収穫中 |
| | | 高岡市 | 0.3 | 100 | 千両 千両2号 | 80 20 | | | 5/7 (4/27) | 5/9 | 並 | 並 | | 生育は順調 |

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | は種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 | |
| すいか | トンネル早熟 | 入善町 | 3.3 | 89 | 入善ジャンボ | 100 | 4/2 (4/2) | 4/10 (4/10) | 4/22 (4/26) | 5/8 (5/5) | やや早い | 並 | 6月下旬の高温 | 1番果出荷終了、2番果出荷盛期、2番果収穫は7/26から始まる。 | |
| キャベツ | 秋まき 春どり | 射水市 | (2.3) | | 初恋 | | 7/15 (7/12) | | 8/7 (8/6) | | 並 | 並 | は種後の曇雨天、育苗期後半の高温(7月6半旬以降) | 苗の徒長、かん水不足による葉の枯死が発生 | |
| 加工用キャベツ | 夏まき 秋冬どり | 入善町 | 0.9 (見込み) | 100 | おきなSP | 100 | 7/15 (7/12) | 7/28 (7/27) | 8/5 (7/30) | (8/20) | 並 | 並 | | 7/15は種は本葉3枚で定植、その他は育苗中で生育そろい良好 | |
| | | 富山市 (JAなのほな) | 2.9 (見込み) | 73 | おきなSP 輝吉 | 37 35 | 7/13 (7/20) | | 8/6 (7/30) | (8/11) | (8/31) | 並 | 並 | | 育苗はおおむね順調 |
| | | 小矢部市 (福岡含) | 18.0 | 103 | おきな 恋唄(THY105) | 51 22 | 7/5 (7/5) | (8/6) | 7/29 (7/31) | (9/15) | | 並 | 並 | は種後の曇雨天、育苗期後半の高温(7月6半旬以降) | 高温の影響で一部苗が徒長、定植以降も高温により一部の株が枯死 |
| | | 南砺市 (福光) | 0.96 | 157 | 輝吉 おきな | 60 40 | 7/9 | 7/下 | 8/1 | | | 並 | 並 | 高温乾燥 | 早植えで本葉5枚程度、胚軸1cm、定植翌日うね間かん水実施 |
| ブロッコリー | 夏まき 秋冬どり | 射水市 | (2.5) | (100) | おはよう サマードーム | (50) (30) | 7/13 (7/15) | (8/6) | (8/6) | (9/4) | 並 | 並 | | 育苗中、生育順調 | |
| | | 南砺市 (福光) | 1 | 100 | おはよう | 100 | 7/中 | 7/26 | 8/中 | 9/上 | 並 | 並 | 高温乾燥 | 本葉2枚(7/18は種)程度、一部発芽後の搬出遅れでやや徒長 | |
| アスパラガス | 露地普通 (ハウス1戸) | 南砺市 (福光) | 3.3 | 100 | グリーンタワー ウィンデル | 75 20 | () | () | () | () | 並 | 並 | 高温乾燥 | 春どり栽培で草丈2m以上、立茎春夏どり栽培で草丈2m以上及び収穫中、一期どり栽培で草丈130cm程度 | |
| だいこん | 夏まき 秋冬どり | 魚津市 | 19.0 (見込み) | 102 | 夏の翼 秋の翼 | 40 30 | 7/30 | | - | - | 並 | 並 | | 順調には種作業が行われている。 | |
| 中小かぶ | 露地 | 富山市 (神明) | 4 (見込み) | 100 | | | 8/21 (8/18) | () | | | | | | 8月中下旬よりは種開始 | |
| にんじん | 夏まき 秋冬どり | 富山市 (あおぼ全域) | 1.4 | 107 | 愛紅 彩誉 | 70 20 | 7/21 (7/20) | | | | 並 | 並 | | 7月は種で発芽始め、一部クラスト化による出芽不良 | |
| | | 高岡市 | 9.5 | 100 | 愛紅 紅ひなた | | 7/26 (7/19) | (8/31) | | | | | | 一部で碎土率が低く雑草が発生している。 | |
| | | 砺波市 南砺市 | 12.6 | 79 | 紅ひなた 愛紅 | 45 35 | 7/25 () | () | () | () | 並 | 並 | 高温乾燥 | 7/25は種で発芽始め | |
| | | 南砺市 (福光) | 8.9 | 148 | 愛紅 紅ひなた | 57 43 | 7/21 () | () | () | () | 並 | 並 | 高温乾燥 | 7/21には種で本葉1枚程度 | |
| さといも | 普通 | 入善・朝日 | 3.6 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/上 (4/7) | | 並 | 並 | | 葉柄長100~110cm、生葉数4~6枚、生育はおおむね順調 | |
| | | 上市町 (見込み) | 10.0 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/5 (4/5) | 6/2 (6/2) | 並 | 並 | | 4月上旬定植で最大葉柄長約120~130cm、最大葉長約50cm | |
| | | 高岡市 (福岡除く) | 8.9 | 100 | 大和 | 100 | | | 4/4 (4/6) | 5/9 (5/15) | 並 | 並 | | 葉数5枚展開、大きい株で草丈100cm | |
| | | 小矢部 (福岡含む) | 4.2 | 124 | 大和 | 100 | | | 4/1 (4/10) | 5/8 (4/20) | 並 | 並 | | 葉数5~7枚展開、草丈100~110cm | |
| | | 砺波市 | 1.2 | 100 | 大和 | 95 | | | 5/6 | | 並 | 並 | 高温乾燥、こまめなかん水の実施 | 生葉数5~6枚、葉柄長110~120cm、葉長65cm、葉幅45cm | |
| | | 南砺市 (福野) | 12.1 | 103 | 石川早生 大和 | 30 70 | | | 4/下 5/上 | 5/下 | 並 | 並 | 高温乾燥、こまめなかん水の実施 | 大和:生葉数6~7枚、葉柄長120cm、葉長60cm、葉幅45cm 石川早生:生葉数5~6枚、葉柄長115cm、葉長50cm、葉幅40cm | |
| | | 南砺市 (井波) | 9.9 | 90 | 大和 | 90 | | | 4/20頃 | | 並 | 並 | 高温乾燥 | 生葉数5~6枚、葉柄長100cm、葉長50cm、葉幅40cm | |