

野菜生育情報(9月7日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 夏秋・ 秋冬どり	黒部市	13.0 (見込み)	103	夏扇4号 夏山一本太	45 32	1/17 (11/1)	5/上 (5/上)	3/30 (3/25)	6/中 (6/上)	並	並		一部で湿害、連作等により生育遅延ぎみのほ場・畦があるが、全体としては順調に
		富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	100	項羽一本太 夏扇4号	60 25	2/3 (2/10)	4/5 (4/10)	4/6 (4/20)	5/下 (5/30)	並	やや不良	軟腐病発生	4月中旬定植で草丈100~110cm、生葉数8~9枚
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 源翠	85 10	2/上 (1/11)	4/13 (5/上)	3/下 (3/19)	6/9 (6/9)	並	やや不良	軟腐病発生	4月下旬定植で草丈80~90cm、生葉数6~7枚
		富山市 (大沢野)	2.0 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	40 30	2/19 (1/30)	4/20 (3/30)	4/13 (4/6)	5/31 (6/7)	並	並		6月定植で草丈65~70cm、生葉数4.2枚
		富山市 (大山)	0.6 (見込み)	100	夏扇4号 夏山一本太	70 30	2/28 (2/22)	3/4 (3/26)	4/6 (4/6)	4/12 (4/12)	並	並		盆過ぎから出荷開始
		立山町	10.0 (見込み)	90	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	12/25 (1/5)	4/11 (4/10)	3/28 (3/24)	6/4 (5/20)	並	並		3月下旬定植分は収穫終了、4月中~下旬定植分で収穫中
	春まき 夏秋どり	射水市	3.1	100	夏扇パワー 源翠	(30) (20)	1/10 (1/10)	3/1 (3/1)	3/25 (3/25)	4/25 (4/25)	並	やや不良	8月3半旬以降の降雨	草丈70cm程度、降雨により土寄せが行えず、軟白部にぼけが生じている。
		氷見市	3.0	100	夏山一本太 龍美	(40) (24)	1/7 (1/10)	3/1 (2/1)	3/10 (3/10)	4/20 (4/5)	やや遅い	並	8月3半旬以降の降雨	草丈80cm程度、葉鞘径14~20mmでやや細く、新葉展開および葉鞘の伸長がやや遅れている。
	春まき 秋冬どり	射水市	3.8	100	関羽一本太 ホワイトスター	(30) (30)	2/20 (2/20)	4/10 (4/10)	4/15 (4/15)	6/13 (5/29)	並	並		草丈60cm程度。葉先枯れが生じている。
		氷見市	3.0	120	秋の宝山 ホワイトソート	40 20	2/1 (2/1)	3/25 (3/20)	4/20 (4/10)	5/10 (5/11)	やや遅い	並	8月3半旬以降の降雨	草丈40~60cm、葉鞘径11~16mm、8月3半旬以降の降雨により生育が停滞している。
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	4.5	90	関羽	95	1/11 (1/11)	()	3/29 ()	3/30 ()	やや遅い	並	天候に合わせた栽培管理(土寄せ等)により、生育は良好	欠株が少なく、歩留まりは高い。
		南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	1/下 (1/下)	()	(4/1) ()	()	並	並	土寄せ・防除等の作業は適切に実施されており、生育は良好、病害虫も見られない。	草丈75~80cm、生葉数7~8枚
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	0.6 (見込み)	55	越中なつ小町 越中ふゆ小町	72 28	1/17 (1/22)	4/上 (3/30)	3/25 (3/25)	5/中 (5/上)	並	並		出荷者1名、面積も少なく袋詰め対応、9月中旬頃まで出荷予定
		魚津市	0.7	64	越中なつ小町 越中ふゆ小町	60 40	1/17 (1/10)	()	4/2 (1/23)	4/9 (3/25)	並	並		収穫終了
青ねぎ	周年	富山市 (富山)	(見込み)		緑秀		周年			並	並		6月は種分は収穫中	
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3.0 (見込み)	100	ジャスティス		周年				並	並		8/29は種で子葉展開
		高岡市	11.0	100	ミラージュ	60	周年	周年	-	-	並	並		生育は平年並である。
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	なつき 浜ちゃん	70 30	周年				並	並		生育順調、発芽そろいは良好だが、一部ハウスでは広葉雑草の発生が多い。
		富山市 (JAなのほな)	5.8 (見込み)	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育はおおむね順調、高温により一部で葉焼け発生
		富山市 (八尾)	2.2	100	春のセンバツ さくらぎ	60 30	周年				並	並		生育はおおむね良好
		射水市	2.0	100	なつき	(40)	周年	周年	-	-	並	並		生育はおおむね順調
えだまめ		射水市	37.0□	100	たんくろう	100	3/25 (3/20)	(7/30)	-	-	やや遅い	並	8月3半旬以降の降雨	6月下旬は種のほ場を収穫中、子実の肥大が遅く、予定より1週間程度収穫が遅延している。7月中下旬は種で生育が遅れている。
きゅうり	抑制	入善・朝日	0.6 (見込み)	100	ニーナ 兼備2号	50 30	7/上 (7/上)		7/下 (7/下)	8/下 (8/上)	並	並		一部高温で萎れがみられる。定植の早いものは側枝果収穫始め。
		富山市 (八ヶ山)	0.4 (見込み)	63	兼備2号 T178	33 38			7/中 (8/5)	8/9 (8/22)	並	並		7月下旬定植で主枝摘芯終了、一部で土壌の高ECにより株の萎れが発生
		富山市 (南部施設)	0.1 (見込み)	100	兼備2号	80	購入苗				並	並		8/10定植、主枝摘芯中、下部側枝摘除完了、側枝伸長中
なす	露地	上市町	0.2	100	千両2号	100	購入苗		4/27 (4/26)	5/7 (5/6)	並	並		側枝部分の収穫中、収穫期終盤につき収穫量減少傾向
		高岡市	0.3	100	千両 千両2号	80 20			5/7 (4/27)	5/9	並	並		生育は順調、収穫量はやや少なくなっている。

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
キャベツ	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.3)		初恋		7/15 (7/12)		8/7 (8/6)		並	並	8月3半旬以降の降雨	降雨によりほ場条件が悪く、 定植が遅れている。	
加工用キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.3	140	おきなSP	100	7/15 (7/12)	7/28 (7/27)	8/5 (7/30)	8/23 (8/20)	並	並		8/5定植は最大葉長30cm、 8/23定植では一部湿害がみ られる。	
		富山市 (JAなのはな)	2.9	73	おきなSP 輝吉	36 33	7/13 (7/20)	7/30 (7/30)	8/6 (8/11)	8/31 (8/31)	並	並		8月上旬定植で草丈約28cm	
		小矢部市 (福岡含む)	18.0	103	おきな 恋唄(THY105)	51 22	7/5 (7/5)		7/29 (8/6)	7/31 (7/31)	9/15 (9/15)	並	やや不良	8月3半旬以降の降雨	8月上旬定植の定植30日後 の最大外葉長は、20~25cm となっている。8月中下旬の 大雨で一部ほ場で欠株や生 育遅延が発生、一部(2~3 ha)でほ場準備ができず、作 付けを断念した。
		南砺市 (福光)	0.96	157	輝吉 おきな	60 40	7/9 (7/9)	7/下	8/1 (8/1)	8/23 (8/23)		並	並	8月の高温乾燥及び 多雨	8/19定植で生葉数10枚 程度、最大葉長17cm程 度
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.6 (見込み)	100	黄楽70 あきめき	50 30	8/5 (8/5)		8/25 (8/28)	9/16 (9/16)	並	並		8/25定植のほ場で葉長 16cm、葉数12枚程度	
	夏まき 秋冬どり	高岡市	0.5	100	黄ごころ65 きらぼし70	60 20	8/5 (8/3)	8/28 (8/28)	8/25 (8/25)	9/17 (9/17)	並	並		定植後の生育は本葉6枚	
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.5)	(100)	おはよう サマードーム	(50) (30)	7/13 (7/15)		8/22 (8/6)	9/4 (9/4)	並	並		生育は平年並だが、ほ場の 排水不良部分で生育むらが 生じている。	
		南砺市 (福光)	1	100	おはよう	100	7/18 (7/18)	7/26 (7/26)	8/14 (8/14)	9/上 (9/上)	やや遅い	並	8月の高温乾燥及び 多雨	8月中旬定植で出葉数11枚 程度、草丈40cm程度、降雨 により一部定植が遅れている。	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウインデル	75 20	() ()	() ()	() ()		並	並	8月の高温乾燥及び 多雨	春どり及び長期どりで栽培で 草丈2m以上、1年株養成春 一期どりで栽培で草丈160cm 程度	
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	19.0 (見込み)	102	夏の翼 秋の翼	40 30	7/30 (7/31)	9/21 (9/21)	-	-	並	並		全体として順調に生育し、葉 長25cm程度、一部では種直 後の大雨により除草剤の薬 害が発生し、生育が停滞し ている。	
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100	CRもちばな		8/19 (8/21)	()			並	並		8月下旬は種で草丈約7cm	
大かぶ	露地 夏まき 秋冬どり	富山市 (婦中)	6.9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/20頃 (8/27)	9/6 (9/6)			並	並		発芽始め	
		高岡市	6.8	100	早生大かぶ 京千舞	20 80	8/29 (8/20)	9/11 (9/11)			並	並		発芽そろい良好	
		南砺市 (福光)	3.0	100	早生大かぶ	100	8/23 (8/23)	9/中 (9/中)		() ()	並	並	8月の高温乾燥及び 多雨	8/25は種で葉数2枚程度、 発芽率7割程度	
にんじん	夏まき 秋冬どり	富山市 (あおぼ全域)	1.4	107	愛紅 綾誉	70 20	7/21 (7/20)	8/30 (8/15)	() ()	() ()	並	やや不良	は種期の高温、は種 後の降雨により発芽 率低下	発芽率平均45%、8月上旬 は種で出葉数3.5枚	
		高岡市	9.5	100	愛紅 紅ひなた		7/26 (7/19)	8/31 (8/31)			並	並		生育はおおむね順調であ る。一部で碎土率が低く、雑 草が発生している。	
		砺波市 南砺市	12.6	79	紅ひなた 愛紅	45 35	7/25 () ()	() ()	() ()	() ()	やや遅い	やや不良	7月下旬~8月の高 温乾燥及び多雨	7月下旬まきの発芽率悪 い。	
		南砺市 (福光)	8.9	148	愛紅 紅ひなた	57 43	7/21 () ()	8/下 () ()	() ()	() ()	並	やや不良	7月下旬~8月の高 温乾燥及び多雨	7月下旬~8月上旬まで 発芽率4~6割程度(平均5 割程度)、生葉数3~6枚程 度	
さといも	普通	入善・朝日	3.6	100	大和	100			4/上 (4/7)		並	並		草丈100~120cm、生葉数4 ~5枚	
		上市町 (見込み)	10.0	100	大和	100			4/5 (4/5)	6/2 (6/2)	並	並		4月上旬定植で最大葉柄長 約150~160cm、最大葉長約 55cm	
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/4 (4/6)	5/9 (5/15)	並	並		葉数5枚展開、大きい株で 草丈120cm	
		小矢部 (福岡含む)	4.2	124	大和	100			4/1 (4/10)	5/8 (4/20)	並	並		葉数4~5展開、草丈120cm	
		砺波市	1.2	100	大和	95			5/6			並	並	8月中旬の降雨	葉柄長110cm程度(前年100 ~110cm)、生葉数6枚程度 (前年4枚程度)
		南砺市 (福野)	12.1	103	石川早生 大和	30 70			4/下 (4/下)	5/下 (5/下)		並	並	8月中旬の降雨	「石川早生」:葉柄長120~ 130cm(前年140cm)、生葉 数5~6枚程度(前年3~4 枚) 「大和」:葉柄長150cm程 度(前年150~160cm)、生葉 数5~6枚程度(前年3~4枚)
		南砺市 (井波)	9.9	90	大和	90			4/20頃			並	並	8月中旬の降雨	葉柄長120程度cm(前年 120cm程度)、生葉数6枚程 度(前年4~5枚)
たまねぎ	露地普通	富山市 (JAなのはな)	4 (見込み)	222	ターザン	100	9/1 () ()	() ()	(10/27)	(10/30)	並	並		発芽そろい期、発芽率90% 以上	
		滑川市、上市町 (JAアルプス)	1.5 (見込み)	150	ターザン もみじ3号	80 20	9/1 () ()	() ()	(10/22)	(10/30)	並	並		発芽そろい期、発芽率90% 以上	
		砺波市 南砺市	140	103	ターザン もみじ3号	95 5	8/26		10/中	11/上				発芽期 ※8月26~29日は種分につ いては発芽は良好	