

野菜生育情報(令和3年4月6日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 39	4/20 (4/20)	5/25 (5/25)	6/15 (6/15)	6/26 (6/26)	1週間程度遅い	並		抽たいがみられるほ場あり
		氷見市	1.2	100	羽根緑一本太 吉晴	70 30	4/15 (4/1)	4/25 (4/25)	6/5 (6/19)	6/20 (6/20)	1週間程度遅い	並	1~2月の雪	雪による葉の損傷が多く、 新葉の展開が遅れている。
	秋まき 初夏どり	氷見市	0.4	100	羽根緑一本太	100	9/10 (8/20)	9/15 (9/20)	10/24 (10/1)	11/4 (11/1)	2週間程度遅い	並	1~2月の雪	生育は遅く、定植時期による 生育差が大きい。(草丈 25~40cm、葉鞘径6~ 12mm)
	春まき 秋冬どり	黒部市	12.6	102	夏扇4号 夏山一本太	51 36	11/4 (11/1)	5/上 (5/上)	3/19 (3/25)	6/上 (6/上)	並	並		苗は順調に発芽、生育中 定植後の活着はほぼ順 調、草丈16cm、生葉数1.8 枚(1/28播種、3/25定植、 夏山一本太)
		(見込み)												
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	1.2	(80)	夏扇4号 源翠	90 10	2/10 (2/10)	(4/10)	(4/20)	(5/30)	並	並		苗の生育はおおむね良好 4/15頃より定植予定
		中央	6.2	(100)	夏扇4号 源翠	70 20	1/11 (1/10)	(4/2)	3/25 (3/25)	(5/16)	並	並		初夏どりは定植遅れもあり、 欠株多数。8月どりは順 次定植中
		富山市 (大沢野)	2.0	(55)	夏扇4号 夏扇パワー	40 30	2/22 (1/30)	3/4 (3/30)	(4/6)	(5/8)	並	並		苗の生育はおおむね良好 草丈10cm程度
	春まき 夏秋どり	富山市 (大山)	0.6	(80)	夏扇4号	80	2/22 (2/15)	3/4 (3/26)	(4/6)	(4/29)	並	並		苗の生育はおおむね良好 草丈10cm程度
	春まき 夏秋・秋冬どり	立山町	11.0	100	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7 (1/7)	(4/21)	3/26 (3/26)	(6/9)	並	並		一部乾燥による苗の葉先枯れ 活着は順調
		(見込み)												
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	(100)	夏扇パワー 源翠	30 20	1/10 (1/10)	3/1 (3/1)	(3/25)	(4/25)	並	並		育苗順調
		氷見市	3.0	(100)	龍美 源翠	30 30	1/10 (1/5)	2/1 (1/20)	3/10 (3/5)	(4/10)	並	並		定植後の生育は順調
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 ホワイトスター	30 30	2/20 (2/20)	4/10 (4/10)	(4/15)	(5/29)	並	並		育苗順調
		氷見市	2.5	100	秋の宝山 ホワイトソート	40 20	2/1 (2/1)	3/20 (3/25)	(4/12)	(5/2)	並	並		育苗順調
春まき 夏秋どり	砺波市	5	100	関羽	100	1/上 ()	()	3/30 ()	()	やや進んでいる	並	定植が1週間早い	順次定植作業が実施。	
	南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	1/下 ()	4/下 ()	4/1 ()	()	並	並		定植後の活着良好	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.1	100	越中なつ小町	67	1/22	3/30	3/25	5/上	並	並		苗は順調に発芽、生育中 定植後の活着はほぼ順 調、草丈18cm、生葉数2.1 枚(1/22は種、3/25定植、な つ小町)
		(見込み)												
		魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	60 40	1/10 (1/10)	1/23 (1/24)	3/25 (3/25)	(4/18)	並	並		1/10は種、3/25定植のほ 場で、草丈15cm、生葉数2 枚
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3	100			周年				並	並		は種は5月中旬以降
	(見込み)													
	周年	高岡市	11.0	100	ハンター ジャスティス	40 30	-	-	-	-	並	並		露地春まきは2/28からは種 されている。冬越し栽培の 収穫が3/26から開始。露 地・施設共、生育順調
こまつな	周年	魚津市	0.3	75	春のセンバツ のりちゃん	50 50	周年				並	並		生育は平年並み。一部生 産者では種作業が遅れて いる。
	周年	富山市 (JAなのはな)	5.8	100	あっちゃん(収穫中) 春のセンバツ(播種中)	30 30	周年				並	並		生育はおおむね良好。一部 で湿害による生育不良あ り。
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	2.2	105	(春まき)春のセンバツ (春まき)夏楽天	60 30	(周年)				並	並		生育はおおむね良好
	周年	射水市	2.0	100	冬里	(40)	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ	露地	射水市	(37.0)	105	たんくろう	100	3/26 (3/26)	-	-	(8/4)				3月は種のほ場で発芽がみ られている。
トマト	半促成	魚津市	0.5	100	アニモTY-12	100	1/3 (1/上)		3/15 (3/10)	3/26 (3/30)	並	並		1~2段花房が開花中、昨 年より定植始期がやや遅い が平年並
		富山市 (富山)	1.3	72	桃太郎ワンダー その他	80 20	1/11 (1/10)	1/15 (1/15)	3/20 (3/17)	(4/2)	並	並		2段目開花
		南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	60 30	苗購入 ()	()	2/11 ()	2/12 ()	やや遅い	並	冬の低温による苗生育が遅れ たことにより、定植が遅れ、開 花花房が平年より1段程低い。	3段目開花、3段目トーン処理中 1段目順調に肥大
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.8	93	兼備2号 ニーナ	36 21	1/下 (1/下)		3/上 (2/25)		並	並		早い定植で草丈1.2m
すいか	トンネル早熟	入善町	3.7	90	入善ジャンボ	100	4/2 (3/25)				並	並		発芽始め

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	2.7	(100)	春のかほりSP 中早生3号	40 30	9/20 (9/20)	10/10 (10/10)	10/20 (10/21)	11/12 (11/12)	並	並		「春のかほりSP」では結球が始まっている。	
加工用キャベツ	春まき 初夏どり	小矢部市	9.4	138	おきな 初恋	62 38	2/24 (2/20)	3/10 (3/12)	4/1 (4/8)	(4/24)	並~やや早い	並		苗の本葉2.5~3枚展開し、定植が始まっている。	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウインデル	75 20	() ()	() ()	() ()	() ()	並	並		露地は3/29、ハウスは3/20より収穫・出荷(1日15束程度) JA共選は4/7頃から開始予定	
だいこん	トンネル	魚津市	4.4 (見込み)	107	晩々G 夏つかさ旬	40 40	3/30 (3/31)	-	-	-	並	並		3/30は種のほ場(トンネル栽培)で子葉展開。発芽そろう良好	
		富山市 (なのはな) 共販分	0.1	33	天寶	100	3/24 (3/25)	3/31 (3/31)			並	並			
	トンネル マルチ	氷見市	0.8	110	晩抽春のいぶき	90	2/25 (2/20)	3/20 (3/15)	() ()	() ()	並	並		本葉1~3枚	
にんじん	春まき	富山市 (あおぼ全域)	0.3	150	紅ひなた	60	3/20 (3/9)	3/24 (4/10)	() ()	() ()	並	並		発芽はまだみられない	
		高岡市	0.3	100	紅うらら	100	(4/上) (4/12)		-	-	() ()	() ()			4月第2週に、は種見込み
		砺波市	0.4	133	紅ひなた	100	3/19 () ()	3/25 () ()			並	並		不織布のべたがけを実施し、発芽そろう	
たまねぎ	露地普通	砺波市	152	87	ターザン	85	8/25	9/7	10/14	11/上	並	並	融雪直後は大雪の影響で生育が遅かったが、2月下旬以降温暖な気候により生育が進んでいる。	4/5にべと病初発確認(例年より1か月早い)。当該圃場では緊急防除を予定(4/6)、当該ほ場の作付履歴・防除歴は調査中、その他の圃場は生育はおおむね良好	
		南砺市			スタリオン	15									
にんにく	露地普通	南砺市 (城端)	1.7	74	上海早生 嘉定	95 5	() ()	() ()	9/30 () ()	11/1 () ()	並	並	記録的な大雪	年内生育は非常に良好だったが、大雪の影響で茎葉が激しく損傷、平年並みの生育(草丈40~50cm程度)	
ばれいしょ	春植え	富山市 (なのはな、富山)	7.2	105	男爵 とうや	48 52			3/17 (3/9)	3/24 (4/8)	早	並		おおむね計画どおり植付け実施、マルチ栽培は覆土厚15cm、それ以外の経営体は覆土厚3cm程	
		射水市	0.7	100	とうや	100	-	-	3/26 (3/24)	3/27 (4上)	並	並		覆土量はおおむね10cm程度となっている。	
		高岡市	1.0	32	とうや オホーツクチップ	47 32	-	-	3/20 (3/19)	4/3 (4/8)	並	並		一部で土壤水分が高く浅植えとなっている。	

※()は前年実績